§ 07013

乳酸硬脂酸鈣

Calcium Stearyl 2–Lactylate

1. 外觀及性狀：白色至淡黃白色粉末，具特異臭。略溶於水。
2. 鑑　　別：(1)本品 1 g 在 500 ℃下灼燒 1 小時，然後溶於稀鹽酸(1+3) 5 mL 後，其鈣離子試驗呈陽性反應。

   (2) 本品 2 g 與稀鹽酸 (1+3) 10 mL 混合均勻，在水浴中加熱溶解後，趁熱過濾。將濾紙上之殘留物溶於氫氧化鈉溶液 (1+25) 30 mL 中，再於 95 ℃以上水浴中加熱 30 分鐘。冷卻後，加入稀鹽酸 (1+3) 20 mL，並以醚 30 mL 萃取 2 次。合併 2 次萃取液，先以水 20 mL 沖洗，再以無水硫酸鈉脫水之。過濾後，濾液在水浴中加熱，然後蒸發去除醚。殘留物之熔點應在 54～69 ℃。

   (3) 本品之乳酸鹽試驗呈陽性反應。
3. 酸　　價：50～86。
4. 酯　　價：125～164。
5. 砷　　：4 ppm 以下 (以 As_2O_3 計)。
6. 重 金 屬：10 ppm 以下 (以 Pb 計)。
7. 總乳酸量：32～38 %。
8. 鈣 含 量：4.2～5.2 %
9. 熾灼殘渣：14.3～17.7 % (800 ℃)。
10. 分　　類：食品添加物第 (七) 類。
11. 用　　途：品質改良用、釀造用及食品製造用劑。