
§ 03026

α– 醣基異槲皮苷

α – Glycosyl–isoquercitrin

別　　名：Enzymatically modified isoquercitrin；isoquercetin；EMIQ

分子量：約 800



The number of glucose units may vary from 1 (n=0) to 11.

1. 定　　義：由酵素水解芸香苷（rutin）所得異槲皮苷（isoquercitrin），混合澱粉或糊精後，與環狀糊精葡萄糖苷轉移酶（cyclodextrin glucanotransferase）反應產生。
2. 含　　量：60 %以上【乾燥後，以芸香苷（rutin，$C_{27}H_{30}O_{16}$）計】。
3. 外　　觀：黃色至黃橙色粉末、塊狀或糊狀，略具特殊氣味。
4. 鑑　　別：（1）本品 5 mg 溶於水 10 mL，加入 1～2 滴氯化鐵溶液（1→50）後，呈黑褐色。
   （2）本品 5 mg 溶於水 5 mL，加入鹽酸 2 mL 及鎂粉末 0.05 g 後，呈橙色至紅色。
   （3）本品 0.1 g 溶於 1 N 硫酸 100 mL 中，煮沸 2 小時，冷卻後產生黃色析出物。
   （4）光譜光度測定：本品 10 mg 溶於磷酸溶液（1→1,000）500 mL，在波長 255 nm 及 350 nm 附近有最大吸收值。
   （5）薄層色層分析：本品展開後，其 Rf 值較定量用芸香苷（rutin）大。
5. 槲皮素（quercetin）：1 %以下。
6. 重 金 屬：10 mg/kg 以下（以 Pb 計）。
7. 鉛：5 mg/kg 以下。
8. 砷：2 mg/kg 以下（以 As_2O_3 計）。
9. 乾燥減重：50 %以下（135 ℃，2 小時）。
10. 分　　類：第（三）類。
11. 用　　途：抗氧化劑。