§ 08080

氧化鎂

Magnesium Oxide

分子式：MgO　　分子量：40.31

1. 含　　量　：96.0 %以上（在 800 ℃加熱後，以乾重計）。
2. 外觀及性狀　：輕型氧化鎂呈非常膨鬆白色粉末狀；重型氧化鎂呈現緻密白色粉末狀，5 g 的輕氧化鎂體積為 40-50 mL，5 g 的重氧化鎂體積為 10-20 mL，本品可使濕潤的石蕊試紙呈現鹼性。
3. 溶　解　度　：幾乎不溶於水，不溶於酒精。
4. 乾 燥 減 重　：5 %以下（加熱至近 800-825 ℃直至恆重）。
5. 游離鹼及可溶性鹽　：將本品 2.000 g（需精確秤重至 mg）加入 100 mL 水中，在加蓋之燒杯中加熱至沸騰 5 分鐘，在溶液還是熱的時後過濾。以 0.1 N 硫酸滴定加入甲基紅試液之 50 mL 冷卻濾液，不超過 2 mL 酸液可達滴定終點。將 25 mL 濾液蒸發至乾後以 105 ℃乾燥 1 小時，殘渣在 10 mg 以下。
6. 氧　化　鈣　：1.5 %以下（將本品 400 mg 溶解在含有 3 mL 濃硫酸及 22 mL 水之溶液中，加入 50 mL 酒精，將該溶液靜置隔夜。如果硫酸鎂結晶析出，則加熱該液體至 50 ℃，使硫酸鎂溶解。取一具有陶瓷濾器的坩鍋，並以 2 倍體積之乙醇與 1 倍體積之稀硫酸試液混合液沖洗沉澱物數次，以火燄將坩鍋及其內容物燒至暗紅，然後冷卻並稱重。所得為硫酸鈣之重量，乘以 0.4119，則相當於氧化鈣在樣品中之重量）。
7. 　　砷　　：3 ppm 以下。
8. 　　鉛　　：10 ppm 以下。
9. 重　金　屬　：40 ppm 以下（以 Pb 計）。
10. 分　　類　：食品添加物第（八）類。
11. 用　　途　：營養添加劑。