
§ 01022

鏈黴菌素

Natamycin（Pimaricin）

化 學 名 稱 ：22–（3–Amino–3,6–dideoxy–β–D–mannopyranosyloxy）–1,3,26 –trihydroxy–12–methyl–10–oxo–6,11,28–trioxatricyclo〔22.3.1.$O^{5,7}$〕octacosa–8,14,16,18,20–pentaene–25–carboxylic acid。

分子式：$C_{33}H_{47}NO_{13}$ 分子量：665.74



1. 外觀及性狀 ：白色～乳白色之結晶性粉末，幾乎無味、無臭。最高可含三莫耳水。約於 280 ℃熔化分解。不溶於水、脂肪及礦物油，微溶於甲醇，可溶於冰醋酸及二甲基甲醯胺（dimethylformamide）。
2. 鑑 別 ：精確稱取 50 mg 置入 200 mL 定容瓶，加水 5.0 mL 使樣品變濕後，加冰醋酸之甲醇溶液（1→1000）100 mL，黑暗下振盪至樣品溶解，再加冰醋酸之甲醇溶液稀釋定容，並予混合。取該溶液 2.0 mL 置入 100 mL 定容瓶，加冰醋酸之甲醇溶液稀釋定容，並予混合；該樣品之紫外光吸收光譜的最大與最小波長應與同時測量的標準品（USP Natamycin Reference Standard）之結果一致。
3. 含 量 ：$C_{33}H_{47}NO_{13}$ 97.0～102.0 ％（以無水基準計）。
4. 重 金 屬 ：20 mg/kg 以下（以 Pb 計）。
5. pH 值 ：5.0～7.5。
6. 比 旋 光 度 ：〔α〕$^{20}_{D}$：＋276°～＋280°。
7. 水 分 ：6.0 ％～9.0 ％。
8. 分 類 ：食品添加物第（一）類。
9. 用 途 ：防腐劑。