§ 08106

氫氧化鎂

Magnesium Hydroxide

分子式：$Mg(OH)_2$　　分子量：58.32

1. 含　　量　：95.0 %以上。
2. 外觀及性狀　：無味，白色膨鬆粉末狀，對濕潤之石蕊試紙呈鹼性。
3. 溶　解　度　：幾乎不溶於水及酒精。
4. 乾 燥 減 重　：2 %以下（105 ℃，2 小時）。
5. 熾 灼 減 重　：30-33 %以下（加熱至近 800 ℃直至恆重）。
6. 游離鹼及可溶性鹽　：將本品 2 g 加入 100 mL 水中，在加蓋之燒杯中加熱至沸騰 5 分鐘，在溶液還是熱的時後過濾。以 0.1 N 硫酸滴定加入甲基紅試液之 50 mL 冷卻濾液，不超過 2 mL 酸液可達滴定終點。將 25 mL 濾液蒸發至乾後以 105 ℃乾燥 3 小時，殘渣在 10 mg 以下。
7. 氧　化　鈣　：1.5 %以下（將本品精確稱重 500 mg 溶解在含有 3 mL 濃硫酸及 22 mL 水之溶液中，加入 50 mL 酒精，將該溶液靜置隔夜。如果硫酸鎂結晶析出，則加熱該液體至 50 ℃，使硫酸鎂溶解。取一古氏坩鍋內墊一石棉墊，並以稀硫酸試液、水及酒精清洗，並燒灼至恆重，並秤重，該溶液以此坩鍋過濾，並以酒精水溶液（酒精：水（v：v）=3：1）沖洗石棉墊上之結晶物數次。將坩鍋燒灼至暗紅，冷卻後稱重，所得為硫酸鈣之重量，乘以 0.4119 則相當於氧化鈣在樣品中之重量）。
8. 　　砷　　：3 ppm 以下。
9. 　　鉛　　：10 ppm 以下。
10. 重　金　屬　：40 ppm 以下。
11. 分　　類　：食品添加物第（八）類。
12. 用　　途　：營養添加劑。