
A
Random Forest ROC − PDAC vs Control (stool)
Sensitivity
Specificity
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Cohort
All_stool (AUC = 0.85)
Kartal−1_2022 (AUC = 0.85)
Kartal−2_2022 (AUC = 0.83)
Nagata_2022 (AUC = 0.78)
Vilà−Quintana_2024 (AUC = 0.87)
Matsukawa_2021 (AUC = 0.76)
B
Prevalence−integrated RF − top 50 species across PDAC stool cohorts
Top 50 important species
Blautia wexlerae
Faecalibacterium prausnitzii
Fusicatenibacter saccharivorans
Agathobaculum butyriciproducens
Bacteroides uniformis
Bifidobacterium longum
Blautia faecis
Ruminococcus gnavus
Eubacterium rectale
Parabacteroides distasonis
Bacteroides thetaiotaomicron
Dysosmobacter welbionis
Flavonifractor plautii
Streptococcus salivarius
Blautia massiliensis
Anaerostipes hadrus
Phocaeicola vulgatus
Dorea longicatena
Bacteroides ovatus
Ruminococcus bromii
Gemmiger formicilis
Parabacteroides merdae
Bacteroides caccae
Lachnospira pectinoschiza
Streptococcus parasanguinis
Ruminococcus torques
Dorea formicigenerans
Odoribacter splanchnicus
Ruthenibacterium lactatiformans
Clostridiales bacterium KLE1615
Faecalibacterium SGB15346
Blautia obeum
Clostridiaceae bacterium
Veillonella parvula
Bilophila wadsworthia
Enterocloster bolteae
Anaerobutyricum soehngenii
Collinsella aerofaciens
Lawsonibacter asaccharolyticus
Alistipes putredinis
Clostridium fessum
Roseburia inulinivorans
Phocaeicola dorei
Oscillibacter valericigenes
Eggerthella lenta
Escherichia coli
Clostridiales bacterium
Alistipes onderdonkii
Bacteroides xylanisolvens
Alistipes shahii
All_stool C=351, PC=189
Kartal−1_2022 C=53, PC=67
Kartal−2_2022 C=32, PC=44
Nagata_2022 C=235, PC=43
Vilà−Quintana_2024 C=18, PC=11
Matsukawa_2021 C=13, PC=24
Cohort (C = controls, PC = pancreatic cancer)
Direction
Enriched
Depleted
Prev−integrated RF importance
1
2
3
C
Random Forest ROC − PDAC vs Control (saliva)
Sensitivity
Specificity
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Cohort
All_saliva (AUC = 0.83)
Kartal−1_2022 (AUC = 0.45)
Nagata_2022 (AUC = 0.82)
Vilà−Quintana_2024 (AUC = 0.87)
D
Prevalence−integrated RF − top 50 species across PDAC saliva cohorts
Top 50 important species
Streptococcus salivarius
Rothia mucilaginosa
Gemella sanguinis
Prevotella salivae
Veillonella parvula
Streptococcus mitis
Streptococcus infantis
Peptostreptococcus stomatis
Prevotella melaninogenica
Rothia SGB49305
Streptococcus parasanguinis
Lancefieldella parvula
Prevotella pallens
Fusobacterium nucleatum
Streptococcus sanguinis
Campylobacter concisus
Granulicatella SGB5255
Veillonella atypica
Mogibacterium diversum
Actinomyces sp ph3
Streptococcus oralis
Actinomyces oris
Granulicatella adiacens
Neisseria subflava
Megasphaera micronuciformis
Rothia aeria
Actinomyces graevenitzii
Solobacterium SGB6839
Actinomyces SGB17132
Prevotella nanceiensis
Veillonella dispar
Porphyromonas bobii
Fusobacterium periodonticum
Actinomyces sp ICM47
Prevotella jejuni
TM7 phylum sp oral taxon 352
Parvimonas micra
Streptococcus gordonii
Actinomyces naeslundii
Capnocytophaga gingivalis
Eubacterium sulci
Leptotrichia wadei
Schaalia odontolytica
Gemella haemolysans
Streptococcus australis
Alloprevotella tannerae
Peptostreptococcus SGB7479
Prevotella nigrescens
All saliva C=304, PC=116
Kartal−1_2022 C=48, PC=43
Nagata_2022 C=235, PC=47
Vilà−Quintana_2024 C=21, PC=11
Cohort (C = controls, PC = pancreatic cancer)
Direction
Enriched
Depleted
Prev−integrated RF importance
1
2
3
4