

計量分析 2：復習テスト 5

学籍番号 _____ 氏名 _____

2022 年 10 月 27 日

注意：すべての質問に解答しなければ提出とは認めない。正答に修正した上で、復習テスト 1～8 を（左上で）ホチキス止めし、中間試験実施日（12 月 1 日の予定）にまとめて提出すること。

1. 平均 μ , 分散 σ^2 の母集団から抽出した大きさ n の無作為標本の標本平均を \bar{X}_n , 標本分散を s_n^2 とする.

(a) \bar{X}_n が μ の不偏推定量であることを示しなさい.

(b) \bar{X}_n が μ の一致推定量であることを示しなさい（ヒント：大数の法則）.

(c) \bar{X}_n の分散を求めなさい.

(d) \bar{X}_n の漸近分布を求めなさい（ヒント：中心極限定理）.

(e) s_n^2 が σ^2 の不偏推定量であることを示しなさい.

2. $N(\mu, \sigma^2)$ から抽出した大きさ n の無作為標本の標本平均を \bar{X} とする. 次の片側検定問題を考える.

$$H_0 : \mu = c \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu > c$$

有意水準を 5 % とする.

(a) \bar{X} の分布を求めなさい.

(b) 検定統計量を与えなさい.

(c) 検定統計量の H_0 の下での分布を与えなさい.

(d) $n = 10$ として検定の棄却域を定めなさい (必要な分布表は各自で入手すること).

(e) 検定統計量の値が 2.0 なら検定結果はどうなるか?

(f) p 値が 0.1 なら検定結果はどうなるか?

解答例

1. (a) 期待値の線形性より

$$\begin{aligned} E(\bar{X}_n) &= E\left(\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}\right) \\ &= \frac{E(X_1) + \cdots + E(X_n)}{n} \\ &= \frac{\mu + \cdots + \mu}{n} \\ &= \mu \end{aligned}$$

(b) (チェビシェフの) 大数の弱法則より

$$\text{plim}_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n = \mu$$

(c) X_1, \dots, X_n は独立なので

$$\begin{aligned} \text{var}(\bar{X}_n) &= \text{var}\left(\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}\right) \\ &= \frac{\text{var}(X_1 + \cdots + X_n)}{n^2} \\ &= \frac{\text{var}(X_1) + \cdots + \text{var}(X_n)}{n^2} \\ &= \frac{\sigma^2 + \cdots + \sigma^2}{n^2} \\ &= \frac{\sigma^2}{n} \end{aligned}$$

(d) (リンダバーグ=レヴィの) 中心極限定理より

$$\bar{X}_n \stackrel{a}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

(e) $E(s_n^2) = \sigma^2$ を示すには, 次式を示せばよい.

$$E\left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2\right) = (n-1)\sigma^2$$

ここで

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 &= \sum_{i=1}^n [(X_i - \mu) - (\bar{X}_n - \mu)]^2 \\ &= \sum_{i=1}^n [(X_i - \mu)^2 - 2(X_i - \mu)(\bar{X}_n - \mu) + (\bar{X}_n - \mu)^2] \\ &= \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - 2 \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)(\bar{X}_n - \mu) + n(\bar{X}_n - \mu)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X}_n - \mu)^2 \end{aligned}$$

期待値をとると

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 \right) &= \sum_{i=1}^n \mathbb{E} ((X_i - \mu)^2) - n \mathbb{E} ((\bar{X}_n - \mu)^2) \\ &= \sum_{i=1}^n \text{var}(X_i) - n \text{var}(\bar{X}_n) \\ &= n\sigma^2 - n \frac{\sigma^2}{n} \\ &= (n-1)\sigma^2 \end{aligned}$$

2. (a) 前問の計算より \bar{X} の平均は μ , 分散は σ^2/n . 正規分布の線形変換は正規分布なので

$$\bar{X} \sim N \left(\mu, \frac{\sigma^2}{n} \right)$$

- (b) 検定統計量は

$$t := \frac{\bar{X} - c}{\sqrt{s^2/n}}$$

- (c) H_0 の下で

$$t \sim t(n-1)$$

- (d) t 分布表より H_0 の下で

$$\Pr[t \geq 1.833] = .05$$

したがって棄却域は $[1.833, \infty)$.

- (e) t 統計量の値が棄却域に入るので H_0 は棄却.

- (f) p 値 > 有意水準なので H_0 は採択.