Representative deposited Microbotryum gene trees

Newick strings are reproduced verbatim; branch lengths are substitution-tree units and are not drawn to scale.

PARs — PARs-g2243 — q1_species

```
(Mv-lag-1253-A1:0.0000010000,Mv-lag-1253-A2:0.0000010000,((Mv-sup-1065-A1:0.0000010000,Mv-sup-1065-A2:0.0000010000):0.0478261824,(Mv-cat-C212-A2:
0.0000010000,Mv-cat-C212-A1:0.0000010000):0.0405516913):0.1717167959);
```

black — black-g2118 — q2_mating_type

```
(Mv-lag-1253-A1:0.0000010000,Mv-lag-1253-A2:0.0000010000,((Mv-sup-1065-A2:0.0274076150,Mv-cat-C212-A2:0.0439287164):0.0841250069,(Mv-sup-1065-A1:
0.0246766164,Mv-cat-C212-A1:0.0543899042):0.0368134658):0.0509292623);
```

turquoise — turquoise-g2357 — q2_mating_type

```
(Mv-lag-1253-A1:0.0000010000,Mv-lag-1253-A2:0.0000010000,((Mv-sup-1065-A1:0.0209648780,Mv-cat-C212-A1:0.0304111974):0.0134409584,(Mv-sup-1065-A2:
0.0223189535,Mv-cat-C212-A2:0.0437525235):0.0144968294):0.1174499478);
```