DOI:10.20197/j.cnki.kxsh.2026.08.053



岳磊

资阳环境科技职业学院心理教师、三级心理咨询师。毕业于华中师范大学心理学院，2022 年工作至今。发表核心期刊论文 3 篇，撰写科普文章数篇。

有一种瘾叫运动成瘾

文/岳磊　彭雨婷　编辑/彭澍

1995 年，Veale 在其研究论文中展示了一个运动成瘾的案例。该案例中的安娜是一名 27 岁的长跑者，她的生活几乎完全围绕着跑步展开，除了跑步之外，她对其他活动几乎没有兴趣。

此后，更多的运动成瘾案例陆续被研究者公布。2024 年春节，贾玲自导自演的电影《热辣滚烫》记录了她减重 50 千克的惊人蜕变，巨大的体重变化成为当年社交媒体最火热的话题之一，运动成瘾也再次进入人们的视野。

电影上映前，贾玲在接受鲁豫访谈时提到，运动是会让人上瘾的。她说，电影杀青后回到家，她控制不住地想要运动，甚至一度认为自己心理出了问题。虽然贾玲的表现并非心理学意义上的运动成瘾，毕竟运动成瘾需具备多个特征，且需通过专业人员的诊断和专业工具的评估，但现实生活中，因为运动而上瘾的案例却不少见。国家体育总局也曾经在官网发布文章，引导民众科学运动，并学会预防和调适运动成瘾。

一、什么是运动成瘾

运动成瘾（EA）一般被认为是一种行为障碍，指个体长期从事某项体育运动，并在运动中产生了强烈的身心依赖，导致运动者的身心因运动受到损害。一项针对匈牙利普通成年人群的调查显示，运动成瘾的发生率为 0.3%～0.5%。其他研究还发现，运动成瘾在运动员群体中的发生率更高。

目前，评估一个人是否运动成瘾，通常采用运动成瘾量表。在多个版本的运动成瘾量表中，EAI 是使用最为广泛的评估工具之一。该量表包含了运动成瘾的六个核心特征：显著性、冲突、情绪调节、耐受性、戒断症状和复发。每个特征对应一个问题，被评估者需对每个问题进行评分，1 分代表强烈不同意问题的描述，5 分代表强烈同意问题的描述。一般认为，6 个问题的总分≥ 24 分，则代表被评估者有运动成瘾倾向。6 个问题如下：

运动是我生活中最重要的事；

由于我运动的量，我和家人、伴侣之间产生了矛盾。

我用运动作为改变情绪的一种方式（比如，获得兴奋感、逃避等）。

随着时间推移，我增加了每日的运动量。

如果我错过一次运动，就会情绪不好、易怒。

我曾减少运动量，之后又重新开始运动，最终运动频率总会和以前一样。

二、运动成瘾的成因

运动成瘾产生的原因非常复杂，生理因素、人格特征、社会文化、其他疾病史都可能导致运动成瘾的发生。

1. 生理因素

涉及大脑奖赏系统神经递质的变化，尤其是多巴胺和内啡肽的释放，被研究者认为是运动成瘾产生的重要原因。运动能刺激多巴胺和内啡肽的分泌，而多巴胺和内啡肽在缓解疼痛、释放压力等方面起着重要的作用。运动成瘾者通过运动获得这些神经递质释放带来的满足和愉悦感，停止运动后满足和愉悦感恢复至较低水平，从而对运动产生依赖和戒断症状。

2. 人格特征

完美主义被认为是与运动成瘾最密切相关的人格特征。运动成瘾者往往对自己有很高的期望，并且这种期望不仅要求自己达到自我期望的标准，还希望自己符合他人的期望。比如，通过不断地运动来达到社会和媒体所要求的身材。此外，运动成瘾

中国知网　https://www.cnki.net

者极有可能会拥有低水平且不稳定的自尊。相比于酒精和药物滥用，运动更能被社会群体接受，所以通过运动来获得暂时性的自尊水平提升，是很多运动成瘾者应对生活困境的选择之一。

3. 社会文化

个体所处的环境对“健康”和“完美身材”的推崇，以及媒体对运动和健身的宣传，都可能促使个体将运动视为一种“必须”的行为。来自社会竞争及同伴的压力（如健身房、运动社群）也可能增加运动成瘾产生的风险。

4. 其他疾病史

运动成瘾也常常被视为其他疾病的伴随症状，主要有进食障碍、强迫症以及其他成瘾障碍。曾有研究表明，那些患有进食障碍的个体运动成瘾的概率是不患有进食障碍个体的 3.7 倍。在强迫症方面，那些在运动成瘾量表上得分较高的人，在强迫症测试中的得分也相对较高。此外，多项研究表明，病态赌博、强迫性购买、网络成瘾与人们在运动成瘾量表上的高得分显著正相关。

三、如何干预和治疗运动成瘾

目前并不存在专门针对运动成瘾的特定干预和治疗方法，很多其他心理问题及障碍的经典干预治疗方法常被用于运动成瘾的治疗。



1. 认知行为疗法

认知行为疗法被认为是治疗运动成瘾最常用的方法之一，它通过渐进式练习和强化来帮助成瘾者建立新的、适应性的、健康的行为模式，以取代旧的不良行为模式。

2. 动机访谈

运动动机是人们参加体育锻炼的初衷，树立正确的运动动机是预防运动成瘾产生的重要措施。当个体不幸成为运动成瘾者后，通过动机访谈与运动成瘾者建立信任关系，帮助他们认识到当前行为对心理的负面影响，然后鼓励他们寻求行为的改变。

3. 冥想

作为治疗各种成瘾的“法宝”，冥想也被研究者建议用来治疗运动成瘾。冥想能有效减轻个体面对巨大压力或伤害时的应激反应，帮助运动成瘾者以更加积极、健康、有效的方式应对压力或伤害，从而减少过度的、有害的运动行为。

4. 替代疗法

寻找运动以外的其他“替代方式”也常被用来干预和治疗运动成瘾。引导运动成瘾者发掘并培养其他能够带来成就感和愉悦感的兴趣爱好（如手工活动、音乐等），用这些积极健康的习惯代替对单一运动的依赖。同时，还可以鼓励运动成瘾者积极主动地参与到更多元的社交活动中，通过丰富他们的社交和精神生活，减少对运动的依赖。

5. 药物治疗

当运动成瘾作为一种症状与其他心理疾病同时存在时，也会使用药物进行治疗。有研究发现，组合使用喹硫平和丙戊酸钠这两种药物，在治疗双相情感障碍合并运动成瘾和强迫性购物行为方面显示出良好的效果。在治疗后，运动成瘾患者的运动成瘾量表得分下降了 50%。

总之，运动成瘾的案例并不少见，科学合理运动尤为重要。运动成瘾的发生受生理、人格、社会文化以及其他疾病等多方面的影响。针对运动成瘾者，可采取多模式干预方案：通过认知行为疗法调整其非理性运动信念，结合冥想缓解强迫性运动焦虑；辅以替代活动疗法重建平衡的健康生活，必要时配合药物干预调节神经生化异常。在此过程中，需建立治疗同盟，逐步引导成瘾者摆脱运动依赖的桎梏，重获行为自主权。

中国知网 https://www.cnki.net