
(a) Posterior TV distance between profiles
cell: mean, 95% CrI
axis: region, N obs.
† prior share > 1%
FP 6,448
SE 8,659
GA 11,718
B1 2,101
B2 6,749
other 4,036
0.17 0.16–0.18
0.18 0.17–0.19
0.03 0.02–0.04
0.15 0.14–0.15
0.11 0.10–0.12
0.10 0.09–0.11
0.24 0.23–0.25
0.08 0.07–0.09
0.09 0.08–0.09
0.13 0.12–0.13
0.07 0.07–0.08
0.17 0.16–0.18
0.17 0.16–0.18
0.14 0.13–0.15
0.24 0.23–0.26
0.23 0.22–0.24
0.06 0.06–0.07
0.06 0.05–0.07
0.11 0.10–0.12
0.03 0.02–0.04
0.23 0.22–0.24
AP 28,782
FP 6,448
SE 8,659
GA 11,718
B1 2,101
B2 6,749
(b) Profiles, 4 best-populated subpockets
AP N = 28,782
GA N = 11,718
SE N = 8,659
B2 N = 6,749
Apolar
Arom. face-face
Arom. edge-face
H-bond, prot. donor
H-bond, prot. acceptor
Prot. cation : lig. anion
Prot. anion : lig. cation
10^{-4}
10^{-1}
posterior proportion (log; values < 10^{-5} drawn at 10^{-5})
mean, 50% / 95% CrI
n < 10
'other' reference, 95% CrI