
(a) Posterior TV distance between profiles
cell: mean, 95% CrI
axis: region, N obs.
† prior share > 1%
FP 2,640
SE 1,981
GA 1,404
B1 192
B2 299
other 303
0.49 0.47–0.51
0.40 0.37–0.42
0.12 0.10–0.15
0.22 0.20–0.24
0.30 0.27–0.33
0.24 0.21–0.27
0.18† 0.12–0.24
0.32† 0.26–0.38
0.23† 0.19–0.28
0.10† 0.06–0.14
0.36† 0.31–0.42
0.15† 0.10–0.20
0.15† 0.11–0.18
0.16† 0.11–0.21
0.19† 0.11–0.26
0.65† 0.59–0.70
0.20† 0.15–0.26
0.26† 0.20–0.31
0.49† 0.43–0.55
0.48† 0.41–0.55
0.34† 0.27–0.41
AP 3,322
FP 2,640
SE 1,981
GA 1,404
B1 192
B2 299
(b) Profiles, 4 best-populated subpockets
AP N = 3,322
FP N = 2,640
SE N = 1,981
GA N = 1,404
Charged
Aromatic
Polar, non-aromatic
Aliphatic
0
0.5
1
posterior proportion (linear)
mean, 50% / 95% CrI
n < 10
'other' reference, 95% CrI