§2 消失定理の射程

第 I 層：局所 1-point data

$\mathfrak{E}_1^{\mathrm{loc}}(\rho) = \{\langle \hat{\mathcal{O}}(x)\rangle_\rho \mid \hat{\mathcal{O}} \in \mathcal{C}_{\mathrm{ex}}\}$

追加データ不要

対称真空で $= \{0\}$（定理 2.6.1）

第 II 層：Defect / 非局所 data

$\mathfrak{E}^{\mathrm{defect}}(\rho) = \{\langle D_p(\Sigma_p)\rangle_\rho\}$

幾何学的 probe（輪郭・面）を要する

対称真空で $\langle W_\circ\rangle_0 > 0$（命題 6.2.5）

第 III 層：情報論的 data

$\mathfrak{E}^{\mathrm{info}}(\rho) = \{S_A(\rho),\ I(A{:}B)_\rho,\ S(\rho_A\|\sigma_A),\ \ldots\}$

領域 A ／参照状態 σ を要する

対称真空で $I(A{:}B)_{\rho_0} \neq 0$

第 IV 層：相関 data

$\mathfrak{E}^{\mathrm{corr}}(\rho) = \{\langle \mathcal{O}_1(x_1)\cdots\mathcal{O}_n(x_n)\rangle_\rho^{\mathrm{c}}\}_{n\geq 2}$

複数の時空点 $(x_1,\ldots,x_n)$ を要する

対称真空で $\langle \mathcal{O}(x)\,\mathcal{O}(0)\rangle_0 \neq 0$

対称真空でも非零
（定理 6.6.1）