

計量経済学応用

5. 単回帰分析

矢内 勇生

2018年4月19日

高知工科大学 経済・マネジメント学群

今日の目標

- 回帰分析の基本的な仕組みを理解する
- 最小二乗法を理解する
- Rで単回帰分析を実行する

例題

- 父親の身長と息子の身長の間にはどんな関係がある？

原因と結果

- 原因：父親の身長
 - ▶ 説明変数 (explanatory variable)
 - ▶ 他の呼び名：独立変数、予測変数、入力、特徴量
- 結果：子の身長
 - ▶ 結果変数 (outcome variable)
 - ▶ 他の呼び名：従属変数、応答変数、出力

親子の身長の関係


- 2変数の関係を調べたい

どうする？

(ヒント：2変数とも数量変数)

- 図示する → 散布図
- 統計量を求める → 相関係数

散布図と相関係数





わかったことと新たな疑問

- ・ 父親の身長が高いほど、息子の身長が高い

Q1：父親の身長は息子の身長にどの程度影響するの？

Q2：父親の身長が x cm のとき、息子の身長は何cmになりそう？

相関係数だけでは新たな 疑問に答えられない！



相関係数だけでは不十分な理由

- 相関係数が似ていても「傾き（ある変数がもう1つの変数に与える影響の大きさ）」が異なる
- 相関係数がわかってても、「予測」ができない


直線を当てはめる

- 相関係数は、2変数の直線的関係の強さを示す

➡ 直線を引けばいいのでは？

- 直線 = 1次関数 \rightarrow x の値（父親の身長）から y の値（息子の身長）が予測できる！

線形回帰分析：直線を当てはめる



回帰直線 (regression line)

- 結果変数と説明変数の関係を表す直線
 - 傾き（応答変数に対する説明変数の影響の大きさ）がわかる
 - 結果変数の値を予測できる
- 結果変数の値が決まる原因を説明変数に帰する = 「結果変数を説明変数に回帰する」
- ▶ 回帰分析を行うときは、
 - 1つの結果変数と1つ以上の説明変数が必要
 - 結果変数を縦軸、説明変数を横軸に！

直線

- 説明変数をx、応答変数をyとすると、直線は1次関数

$$y = a + bx$$


で表すことができる

- a : y切片


- b : 傾き

➡ 直線を求める : a と b を求める

直線は点とズレる



残差 = 直線から点までの垂直距離



残差：直線と点のずれ

- 残差 e
- 点を直線 $(a + bx)$ とそこからのズレに分ける

$$y_i = a + bx_i + e_i = \hat{y}_i + e_i$$

ただし、 $i = 1, 2, \dots, n$

- \hat{y}_i ：予測値
- 観測値 = 予測値 + 残差

ズレを小さくしたい

- 残差の平均値を小さくする？
 - プラスとマイナスが打ち消し合い、平均値を通ればすべて平均0
- ➡ 残差の二乗の総和（残差平方和）を小さくする：最小二乗法

最小二乗法

(least squares method)

- 残差平方和を最小にすることで、散布図によく当てはまる（点とのズレが小さい）直線を求める方法
- 以下の式を最小にする a と b を求める

$$\sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i)^2$$

最小二乗法でa と b を求めると

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

$$b = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2}$$

- これで、回帰直線 $\hat{y} = a + bx$ が求められた
- 回帰直線は、点 (\bar{x}, \bar{y}) を通る

回帰直線を求める

- 授業のWebページを参考に、回帰直線を求めてみよう
- 例：衆議院議員選挙の結果

結果の解釈：身長の例

$$\text{息子の身長} = 69.8 + 0.6 \times \text{父の身長}$$

- 父の身長が1cm 高くなると、息子の身長は0.6cm 高くなると考えられる
- 父の身長が0cm のとき、息子の身長は69.8cm になると予測される

より一般的に

- 傾き b は、説明変数の値が1単位増加したとき、結果変数が何単位増加するかを表す
- 切片 a は、説明変数の値が0のときの結果変数の予測値
 - 説明変数の値が0を取り得ないとき、切片の解釈が難しい → 解決策は次回以降に解説

回帰分析による予測

$$\text{息子の身長} = 69.8 + 0.6 \times \text{父の身長}$$

- 父の身長が170cm のとき、息子の身長は？
 - 予測値 $= 69.8 + 0.6 \times 170 = 171.8$

内挿と外挿

- 内挿 (interpolation) : 実際に観察された説明変数の値の範囲での予測
- 外挿 (extrapolation) : 実際には観察されていない範囲での予測
 - 父親の身長 : [156.9, 185.5]
 - ▶ 父の身長が180cmのときの息子の身長 : 内挿
 - ▶ 父の身長が200cm のときの息子の身長 : 外挿

外挿は危険

- 実際に観測された範囲外では、観察された関係がないかもしれない
 - 特に、直線的関係が局所的な場合
- ▶ 外挿はなるべく避ける
- ▶ 外挿を行う場合は慎重に
- ▶ 理論的におかしな外挿（例：父の身長が5cm のときの息子の身長の予測）はしない