
Common real communities · fixed leaf order
Empirical regional RDR
Mean fitted RDR in region
C01 P 6.5% (n=130)
C02 P 3.1% (n=63)
C03 P 9.6% (n=192)
C04 P 6.7% (n=135)
C05 P 8.2% (n=165)
C06 P 12.7% (n=255)
C07 P 12.0% (n=240)
C08 P 41.1% (n=822)
1.69 1.73 1.80 1.04
0.65 1.26 1.40 1.52
1.30 1.26 1.12 0.92
1.26 1.13 1.34 1.04
1.52 1.14 1.28 0.98
1.08 0.99 1.09 0.95
1.09 1.00 0.91 0.87
0.82 0.85 0.84 1.05
C01 1.78 1.62 1.76 1.03
C02 0.89 1.40 1.57 1.50
C03 1.39 1.22 1.17 0.91
C04 1.35 1.14 1.37 0.99
C05 1.53 1.11 1.33 1.00
C06 1.15 1.02 1.18 1.02
C07 1.14 0.92 0.97 0.89
C08 0.86 0.90 0.91 1.10
Bernoulli mixture + ICFM
NADE mask + ICFM
MIDASim mask + ICFM
MIDASim
2: Q deficit
1: equal mass
0: Q excess