

連續隨機變數

- 何謂連續隨機變數？
 - 結果是長度、時間、重量、體積等
 - 實驗所定義的隨機變數的**值域為實數區間**
 - 除非另有說明，我們假設連續型隨機變數之值域為所有**實數**所成的集合
 - **連續隨機變數**無法用**離散型隨機變數**的機率函數分配機率

連續隨機變數 (Cont.)

- 例：某水產養殖場水池裡養了一群虱目魚，隨機撈取一條量測體長
 - 問，當隨機撈到魚的體長大於 14cm 的機率為何？
 - 魚的體長 X 是連續隨機變數
 - 量測 100 條魚後得知，最短 10.1cm，最長 15.8cm
 - 統計量測到的魚體長資料
 - 魚的體長分為 9 個區間，則 $\frac{15.8-10.1}{9}=0.63$

連續隨機變數 (Cont.)


- 假設以 0.7 為區間長度，並得到下列統計資料

- 魚體長大於 14cm

機率約為

$$\frac{13+29+5}{100}=0.47$$

- 若增加量測的魚數量則區間會增加，且直條圖會平滑成 $y=f(x)$ 曲線



Yung-Chen Chou

連續隨機變數 (Cont.)

- 魚體長落在某一區間的機率與區間所包含的面積成正比
- $y = f(x)$ 函數稱為隨機變數 X 之機率密度函數

定義

若 f 為實數函數，且滿足

$$(1) f(x) \geq 0$$

$$(2) \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$


連續隨機變數 (Cont.)

- 若連續隨機變數 X 之機率密度函數為 $y = f(x)$ ，則對 $a \leq b$

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$$

- 若於上式取 $b = a$ 則 $P(X = a) = \int_a^a f(x) dx = 0$
- 因此，在連續隨機變數出現任一點的機率均為 0，且 $P(a < X < a) = P(a < X \leq a) = P(a \leq X < a) = P(a \leq X \leq a)$

連續隨機變數 (Cont.)






- 並非所有先前提到機率函數都可做為隨機變數 X 的密度
- 必須注意的是，機率永遠不會是負值，且

$$P(-\infty < X < \infty) = 1$$

- 因此， $f(x) \geq 0$ for all x


連續隨機變數 (Cont.)

- 且 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$
- 上式之所以成立必須滿足 $f(\infty) = 0, f(-\infty) = 0$
- 一些典型的密度



連續隨機變數 (Cont.)

- 設隨機變數 X 有密度如 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{9} & \text{where } 0 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$



- 因 $f(x) \geq 0$ ，所以這是個合理的密度，且

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_0^3 \frac{1}{9} x^2 dx = \frac{x^3}{27} \Big|_0^3 = \frac{27}{27} - \frac{0}{27} = 1$$

- 因此 $P(1 \leq X \leq 2) = \int_1^2 \frac{1}{9} x^2 dx = \frac{x^3}{27} \Big|_1^2 = \frac{2^3}{27} - \frac{1^3}{27} = \frac{7}{27}$

$$P(X \leq 1) = \int_{-\infty}^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{9} x^2 dx = \frac{x^3}{27} \Big|_0^1 = \frac{1^3}{27} - \frac{0^3}{27} = \frac{1}{27}$$


$$P(X \geq 3) = \int_3^{\infty} 0 dx = 0$$

Yung-Chen Chou

連續隨機變數 (Cont.)

- 方程式 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{9} & \text{where } 0 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$

- 可改寫成 $\Rightarrow f(x) = \frac{x^2}{9}$ where $0 \leq x \leq 3$

- 但不可只寫 $f(x) = \frac{x^2}{9}$  不是合理的密度

- 若 X 為一連續機率變數則 $P(X=x)=0$

- 因為 $\int_x^x f(x)dx=0$

即使 $X=x$ 是可能的，它的機率還是 0

連續隨機變數 (Cont.)

- 導出 $P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X < b)$
- 以 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{9} & \text{where } 0 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$ 為例
- $P(1 \leq X \leq 2) = P(1 \leq X < 2) = P(1 < X \leq 2) = P(1 < X < 2) = \frac{7}{27}$

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{x^3}{27} dx &= \frac{x^3}{27} \Big|_1^2 \\ &= \frac{8}{27} - \frac{1}{27} \\ &= \frac{7}{27} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} P(1 \leq X < 2) &= P(1 \leq X \leq 2) - P(X = 2) \\ \int_1^2 \frac{x^2}{9} dx - \int_2^2 \frac{x^2}{9} dx &= \frac{x^3}{27} \Big|_1^2 - 0 \\ &= \frac{8}{27} - \frac{1}{27} - 0 \\ &= \frac{7}{27} \end{aligned}$$

Yung-Chen Chou

連續隨機變數 (Cont.)

- 事件 $X \approx x$

- 設 x 的密度函數為 $f(x)$



- 當 X 很接近 x 情況，以 $X \approx x$ 表示之


- 利用 密度 \times 長度 的公式可得到 $P(X \approx x) = f(x) dx$

- 均勻分佈隨機變數的密度

- 設 X 均勻分佈在 $[a, b]$ 區間，即 $P(X = \text{事件}) = \frac{\text{符合的長度}}{\text{全部的長度}}$

- 將一個單位的機率事件攤在 $b-a$ 呎的長度，單位機率為 $\frac{1}{b-a}$ ，且其機率密度為 $f(x) = \frac{1}{b-a}$ where $a \leq x \leq b$

連續隨機變數 (Cont.)



- 在區間 $[a, b]$ 上，因 X 是均勻分佈，故 $f(x)$ 有固定的高度
- 再者，由於全部的面積必定是 1，且底是 $b-a$ ，因此，其高度必定是 $\frac{1}{b-a}$
- 例：若 X 是均勻分佈在 $[-3, 7]$ ，則

$$f(x) = \frac{1}{10} \text{ where } -3 \leq x \leq 7$$

分佈函數

- 密度函數：用 $f(x)$ 表示
- 分佈函數：用 $F(x)$ 表示
- 何謂分佈函數？
 - 令 $f(x)$ 是隨機變數 X 的密度函數，則這些機率是由一個函數所形成，此函數稱之為分佈函數，並用 $F(X)$ 表示之。


分佈函數 (Cont.)

- 隨機變數的 (累積) 分佈函數
 - 令 x 的分佈函數為 $F(x) = P(X \leq x)$
 - 意思為，截至 x 為止的機率總和
 - 因此，常有人稱之為**累積分佈函數**，並以縮寫 cdf 表示
 - ★ 注意 ★ 每一個隨機變數，不管是離散、連續或其他，均存在**分佈函數**

分佈函數 (Cont.)

- 在連續隨機變數的情況下
 - 除了有分佈函數外，還有密度函數 $f(x)$
 - 以圖形說明
 - 以式子表示


$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx$$



- 相對於圖中 $F(x)$ 所指的連續區域


分佈函數 (Cont.)

- 在離散隨機變數的情況下
 - 設隨機變數 X 只有在 2, 3, 及 π 時有機率存在，即 $P(X=2) = 0.5$, $P(X=3) = 0.2$ 及 $P(X = \pi) = 0.3$
 - 則 x 的機率函數為
$$P(x) = \begin{cases} 0.5 & \text{if } x=2 \\ 0.2 & \text{if } x=3 \\ 0.3 & \text{if } x=\pi \end{cases}$$



分佈函數 (Cont.)


- 設 $F(x)$ 是 X 的分佈函數，表示為累積機率



- 離散隨機變數的分佈是步階函數，高度從 0 到 1
- 在所有 X 的可能值都有跳躍，當 x_0 時，跳躍的大小是 $P(X = x_0)$

分佈函數 (Cont.)

- 電腦畫的圖形
 - 雖不正確卻很好用
 - 一種方便的表示法
- 因應新圖表示法，分佈函數改為



$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } x \leq 2 \\ 0.5 & \text{if } 2 < x \leq 3 \\ 0.7 & \text{if } 3 < x \leq \pi \\ 1 & \text{if } x > \pi \end{cases}$$

分佈函數 (Cont.)

- 均勻分佈隨機變數的分佈函數

- X 均勻分佈在 $[a, b]$ 區間

- 密度函數 $f(x)$



- 累積面積 (機率) 是 1

- 所以 $F(x) = 1$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{if } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{if } x \geq b \end{cases}$$

Yung-Chen Chou

當 x 介於 a 與 b 之間時， $F(x)$ 為陰影區域




分佈函數 (Cont.)

- 混合隨機變數實例—丟骰子
 - 2 點→玩家得 7 元
 - 非 2 點→玩家得 $[3, 5]$ 間隨機選取的金額
 - 設 X 是玩家贏的金額
 - 以連續隨機變數而言 $P(X = x)$ 應為 0
 - 本例， $P(X = 7) = 1/6$ ，所以 X 非連續 (X 沒有密度函數)



分佈函數 (Cont.)

- X 亦不是離散的，因 X 可在 $[3, 5]$ 區間中挑任一個數
- 因此， X 沒有機率函數，但可以題意虛擬一個密度
- 先以圖形表示



$$g(x) + \frac{1}{6} \delta(x-7) \text{ where } g(x) = \frac{5}{12} \text{ for } 3 \leq x \leq 5$$

分佈函數 (Cont.)



- 分佈函數性質

- F 為非遞減 (F 能增或停留在同一高度，但不會下降)
- $F(-\infty)=0, F(\infty)=1$

分佈函數 (Cont.)

- 典型的分佈函數圖示





圖 9 典型的分佈函數

分佈函數 (Cont.)

- 由分佈函數計算機率
 - 分佈函數 $F(x)$ 若在 $x = x_0$ 處有**跳躍** (jump) ，那一定是**向上跳躍** (jump up)
 - 而在 $x = x_0$ 這一點會向上跳躍顯然是在 x_0 的情況大量發生進而使機率提高



分佈函數 (Cont.)

• 因此可整理如下：

- $P(X = x_0) =$ 跳躍的大小
- $P(X \leq x_0) =$ 當 x_0 狀況發生
後機率會變成
跳躍的高點
= 上面的 $F(x_0)$

- $P(X < x_0) =$ 當 x_0 狀況發生前機率是跳躍的低點
= 下方的 $F(x_0)$




圖 10 分佈函數的跳躍

分佈函數 (Cont.)

- 此外

- $$P(X > x_0) = 1 - P(X \leq x_0)$$
$$= 1 - \text{上面的 } F(x_0)$$

- $$P(X \geq x_0) = 1 - P(X < x_0)$$
$$= 1 - \text{下面的 } F(x_0)$$




圖 10 分佈函數的跳躍

分佈函數 (Cont.)

- 若跳躍的情況不是在一點 (e.g. x_0) 而是一個區間 (e.g. $[a, b]$)

- $P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X < a)$

= 上面的 $F(b)$ – 下面的 $F(a)$

(包括在 b 點及 a 點的機率)

- $P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a)$

= 上面的 $F(b)$ – 上面的 $F(a)$

(包括在 b 點的機率)