



HDL 胆固醇升高

作者: **Michael H. Davidson**, MD, FACC, FNLA, University of Chicago Medicine, Pritzker School of Medicine;

Marie Altenburg, MD, The University of Chicago

Reviewed By **Glenn D. Braunstein**, MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 5月 2025 | 修改的 7月 2025

高密度脂蛋白 (HDL) 水平升高是指血液中的 HDL 胆固醇水平异常偏高。

(另见[胆固醇及脂代谢紊乱概述](#)。)

HDL 胆固醇（“好”胆固醇）水平高可能降低心脏病发作和卒中的风险。但出现一些遗传性疾病时，HDL 胆固醇水平可能升高。在这些疾病中，HDL 水平高可能无法预防[心脏病发作](#)或[卒中](#)，这很可能是因为这种疾病会引起另外一些脂质水平改变，身体分解食物的方式也会出现其他异常。

HDL 水平升高可能是

- 原发性：由基因突变引起
- 继发性：由其他病变引起

HDL 水平升高的原发性病因是

- 基因突变导致 HDL 过量生成或清除减少

HDL 胆固醇水平高的继发性病因包括以下所有：

- 无肝硬化的[饮酒相关性疾病](#)
- 甲状腺过度活跃（[甲状腺功能亢进](#)）
- [原发性胆汁性肝硬化](#)
- 药物（如皮质类固醇、胰岛素、苯妥英）

治疗引起 HDL 水平极高的疾病。

胆固醇酯转移蛋白 (CETP) 缺乏症

胆固醇酯转移蛋白 (CETP) 缺乏症是一种罕见的常染色体隐性遗传病，它是 *CETP* 基因突变导致的。CETP 可帮助将胆固醇从 HDL 转运到其他脂蛋白，因此 CETP 缺乏症会影响低密度脂蛋白 (LDL) 胆固醇水平，并减缓从血液中清除 HDL 胆固醇的过程。患者无症状，但血液中的 HDL 胆固醇水平高。无需治疗。

家族性高 α 脂蛋白血症

家族性高 α 脂蛋白血症是各种基因突变引起的一种常染色体显性遗传病。这种病通常是在血常规检查期间发现 HDL 胆固醇水平升高时被诊断的。患者没有症状。无需治疗。