



垂体增大

作者: [John D. Carmichael](#), MD, Keck School of Medicine of the University of Southern California

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 6月 2025 | 修改的 7月 2025

垂体增大通常归因于肿瘤，但也可能是由于垂体出血或受累于一些其他疾病（如[结核病](#)或[结节病](#)）所致。

在有些情况下，垂体增大是由增生（细胞数量增加）所致，而增生可能是因其他腺体分泌的激素水平低而引起（例如，甲状腺分泌的甲状腺激素水平低会导致垂体增大，从而增加促甲状腺激素的生成）。垂体在妊娠期间也会因增生而正常增大。导致增大的这些原因很少引发症状。

在另一些情况下，垂体增大可能引起头痛等症状。因为日益增大的垂体常常会压迫垂体上方的视神经，可能会出现视野缺损。视野缺损开始时通常只影响双眼最外侧的视野。

同时可发生垂体激素产生过多或不足。

诊断依据是[计算机断层扫描](#) (CT) 或[磁共振成像](#) (MRI)。通过检测血液中的激素水平来检查垂体功能。

治疗取决于垂体增大的病因。例如，如果增大是由肿瘤所致，则可根据肿瘤的类型、大小和引起的症状，采用手术、放疗或药物治疗肿瘤。

（另见[垂体概述](#)。）