



高镁血症（血镁水平升高）

作者： [James L. Lewis III](#), MD, Brookwood Baptist Health and Saint Vincent's Ascension Health, Birmingham

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 6月 2025 | 修改的 7月 2025

在高镁血症时，血液中的镁水平过高。

（另见[电解质概述](#)和[镁在人体内的作用概述](#)。）

镁是人体内的一种[电解质](#)，电解质是在溶于血液等体液时带电荷的[矿物质](#)，但体内大部分镁不带电，并与蛋白结合或储存在骨内。体内大部分的[镁](#)在骨内。在血液中循环的镁非常少。

高镁血症是罕见的。通常只在给予[肾衰竭](#)患者镁 (Epsom) 盐或含镁药物（如某些抗酸剂或泻药）时才会发生。

低镁血症的症状

高镁血症可能引起：

- 肌无力
- 低血压
- 呼吸功能损害

当高镁血症很严重时，可发生心跳骤停。

低镁血症的诊断

- 测定血镁水平

诊断依赖于血液检查提示血镁水平增高。

高镁血症的治疗

- 葡萄糖酸钙
- 利尿剂

重度高镁血症患者需接受葡萄糖酸钙静脉内给药，以阻断镁水平升高的毒性作用。

给予利尿剂（促使肾脏排出多余体液的药物），尤其是静脉给药时，会增加肾脏对镁的排泄。但如果肾功能不正常或高镁血症是严重的，则通常需要[透析](#)。