



高钠血症（高血钠水平）

作者： [James L. Lewis III, MD](#), Brookwood Baptist Health and Saint Vincent's Ascension Health, Birmingham

Reviewed By [Glenn D. Braunstein, MD](#), Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 6月 2025 | 修改的 7月 2025

高钠血症指血钠水平过高。

- 许多原因可引起高钠血症，以失水最常见，其余包括摄入水过少、腹泻、肾功能异常、使用利尿剂。
- 患者主要表现为口渴，如果高钠血症恶化，患者可能出现意识模糊，或发生肌肉抽搐和癫痫发作。
- 血液检查来检测钠离子水平。
- 治疗通常为静脉补液和缓慢降低血钠水平。

（另见[电解质概述](#)和[钠在人体内的作用概述](#)。）

钠是人体内的一种电解质，电解质是在溶于血液等体液时带电荷的[矿物质](#)。出现高钠血症时，体内含水量相对于[钠](#)含量来说太少。当失水量超过失钠量时，血钠水平就会异常升高。

通常，高钠血症是[脱水](#)引起的。例如，以下原因可能导致体液流失和脱水：

- 喝水太少
- 呕吐
- 有腹泻
- 使用利尿剂（增加排尿的药物）
- 出汗过多

饮水不足通常起到重要作用。为保持水平衡，健康成人应每天摄入至少 6 杯（约 1½ 夸脱或 2 升）液体。总液体摄入量包括饮用水或其他饮料，以及食用高含水量的食物，如水果、蔬菜和汤。喝水过多要比喝水太少好一些，因为机体排出过多的水分比保存水分要容易得多。喝水过量是可能发生的，但对于健康成人来说，液体摄入量必须达到极度（例如超过 20 升/天）才算是喝水过量。肾功能正常时，机体能够应对液体摄入出现的大幅变化。

您知道吗.....

- 健康成年人每天至少要喝 6 杯水（约 1½ 夸脱或 2 升），包括来自富含水分的食物，如水果和蔬菜。

糖尿病和高血糖患者可能会排尿过量，从而导致脱水。脱水还可能是肾病和**精氨酸加压素抵抗症**导致的；精氨酸加压素抵抗症也会使人排尿过量，但不会引起高血糖，它是加压素分泌不足或不起作用引发的。加压素是一种帮助肾脏保存水分的激素。

在罕见情况下，**肾上腺疾病**会引起轻度高钠血症，但不会导致脱水。盐摄入过多（通常为住院患者）是高钠血症的另一种罕见病因。高钠血症最常见于老年人。

高钠血症的症状

高钠血症可引起口渴。高钠血症最严重的症状为脑功能异常。严重的高钠血症能导致意识模糊（**谵妄**）、肌肉抽搐（**肌阵挛**）、**惊厥**、**昏迷**和死亡。

高钠血症的诊断

- 测定血钠水平

诊断依赖于血液检查提示血钠水平增高。

医生可能会做进一步的检查，以查明高钠血症的病因，包括测定尿量和尿浓度。一种称为**禁水试验**的特殊检查有助于查明某些病因，如精氨酸 加压素抵抗症。医生会在进行这项检查的 12 小时期间仔细监测患者，因为该检查可能有危险。

高钠血症的治疗

- 补液

高钠血症的治疗为补液。除轻症外都要从静脉输入经稀释的液体（含有水和仔细调整过浓度的少量钠）。血钠水平缓慢降低，因为含量下降太快会引起永久性脑损伤。