



低磷血症（血液中的磷酸盐过低）

作者： [James L. Lewis III, MD](#), Brookwood Baptist Health and Saint Vincent's Ascension Health, Birmingham

Reviewed By [Glenn D. Braunstein, MD](#), Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 6月 2025 | 修改的 12月 2025

血磷酸盐过低指血里的磷酸盐含量过低。

（另见[电解质概述](#)和[磷酸盐在人体内的作用概述](#)。）

磷酸盐是人体内的一种[电解质](#)，电解质是在溶于血液等体液时带电荷的[矿物质](#)，但体内大部分磷酸盐不带电。

低磷酸盐血症可能是：

- 急性
- 慢性

急性低磷酸盐血症

出现急性低磷酸盐血症时，血液中的磷酸盐水平会突然降到危险程度。身体在从某些疾病中恢复过来的期间会消耗大量磷酸盐，因此急性低磷酸盐血症可能会发生在从以下病症中恢复的人中：

- 重度[营养不良](#)（包括饥饿）
- 糖尿病酮症酸中毒
- 严重[酒精使用障碍](#)
- 严重[烧伤](#)

磷酸盐水平突然下降可能会引起[异常心律](#)，甚至死亡。

慢性低磷酸盐血症

出现慢性低磷酸盐血症时，血液中的[磷酸盐](#)水平会随着时间的推移而下降。发生慢性低磷酸盐血症通常是因为过多的磷酸盐被排出体外。原因包括：

- [甲状旁腺功能亢进](#)
- 久泻不止
- 长期使用利尿剂
- 长期服用大量含铝的抗酸剂

- 使用大量茶碱（治疗哮喘）

低磷酸盐血症的症状

只有血液中的磷酸盐水平非常低时，才会出现低磷酸盐血症的症状。可能出现肌力减弱，甚至木僵、昏迷和死亡。

长期的低水平血磷酸盐会使骨骼变脆弱，引起骨痛和骨折。患者会感到虚弱和食欲降低。

低磷酸盐血症的诊断

- 测定血液中的磷酸盐水平

如果血液检查结果显示血液中的磷酸盐水平低，则可诊断为低磷酸盐血症。如果原因不明，医生可以做其他的检验来查找原因。

低磷酸盐血症的治疗

- 增加磷酸盐的摄入

停用可降低磷酸盐水平的药物。

轻度且无症状的血磷酸盐过低可应用含有大量磷酸盐的低脂或脱脂牛奶缓解此病。患者也可以口服磷酸盐，但通常会引起腹泻。

如果低磷酸盐血症非常严重或患者无法口服磷酸盐，则可静脉给予磷酸盐。