



非功能性肾上腺肿块

作者: [Ashley B. Grossman](#), MD, University of Oxford; Fellow, Green-Templeton College

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 1月 2026

非功能性肾上腺肿块是指没有激素活性的癌性或非癌性肾上腺赘生物。

(另见[肾上腺概述](#)。)

非功能性肾上腺肿瘤可能是非恶性的，也可能是恶性的。一些肿块为固态，另一些是囊肿（含有液体的组织袋，有时与组织材料混合）。另一些由流血或感染引发。

患者一般没有症状，只是在过量出血形成肿块时，患者会腹痛并可能感觉虚弱或头晕。

通常，患者是在因为其他问题进行计算机辅助断层扫描（CT）或磁共振成像（MRI）检查的时候发现肿块。在大多数情况下，借助精确的影像学检查可以提示肿块是否有可能是癌性的。发现肿块后，医生会做血液实验来检测肾上腺的功能。在大多数情况下，会发现肿块是良性的，如果肿块不活动，患者可无需接受常规随访。

治疗取决于肿块的大小。当肿块大于 1.5 英寸（4 厘米）左右时，通常会手术切除。小于 0.75 英寸（2 厘米）左右的肿块通常无需治疗，但患者需接受血液检查，看看肿块是否开始过量分泌激素。肿块大小在上述尺寸之间且激素水平正常的患者需定期进行血液检查，此外还要进行影像学检查，以确定肿块是否生长。如果出现以下情况，可能需要切除小肿块：

- 生长至约 1.5 英寸（4 厘米）以上。
- 激素水平开始升高并引起症状。
- 肿块可能为癌性。