



迟发性皮肤卟啉病

作者: **Herbert L. Bonkovsky**, MD, Wake Forest University School of Medicine;

Sean R. Rudnick, MD, Wake Forest University School of Medicine

Reviewed By **Glenn D. Braunstein**, MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 1月 2025

迟发性皮肤卟啉病是最常见的**卟啉病**，导致受到日晒的皮肤起疱，变得脆弱。

- 患者暴露于阳光下的部位可出现慢性复发性水疱。
- 过多的铁会积聚在肝脏，引起肝损害。
- 医学检查会发现尿和粪便样品中高含量的卟啉。
- 放血（静脉切开术）、给予氯喹（或羟氯喹）或两者都是有帮助的。

卟啉病是与血红素生成有关的酶异常引起的一组疾病。血红素是一种含铁化合物，它使血液呈红色。血红素是机体数种重要蛋白的关键组分。（另见**卟啉病概述**。）

迟发性皮肤卟啉症在世界各地都有发生。两种主要类型是：

- 1 型：获得性或散发性（约 75% 至 80% 的患者）
- 2 型：遗传性或家族性（约 20% 至 25% 的患者）

有一种非常罕见的 3 型，发生率不到 1%。

就目前所知，偶发性卟啉病是唯一一种在没有遗传性血红素生成酶缺陷的人中发生的卟啉病。

迟发型皮肤卟啉症是由尿卟啉原脱羧酶活性降低引起的，导致了卟啉在肝内的聚集。肝脏疾病很常见。约 35% 的患者会出现**肝硬化**，而 7%-24% 的患者会发生**肝癌**。患者还出现皮肤损伤，因为在肝脏中产生的过量的卟啉经血液转移到皮肤。

迟发型皮肤卟啉症有一些共同的诱发因素。这些因素包括

- 肝内铁过量
- 中度或重度饮酒
- 吸烟
- 服用雌激素
- 感染**丙肝病毒**

丙型肝炎感染是迟发性皮肤卟啉病的主要风险因素，应在所有患有此病的患者中筛查。如果存在丙型肝炎感染，首选治疗是用直接作用抗病毒药物来治愈丙型肝炎病毒感染，这几乎总是会缓解迟发性皮肤卟啉病。

感染[人体免疫缺损病毒](#) (HIV) 是一个不太常见的诱发因素。

这些因素都被认为是在肝中和铁以及氧相互作用的，因而能够抑制或者损害尿卟啉原脱羧酶活性。

某些长期接受[血液透析](#)的人会出现类似于迟发性皮肤卟啉病的皮肤病，因为透析不能充分去除卟啉。这种病被称为终末期肾病的迟发性皮肤卟啉病。

假性卟啉病

肾衰竭、紫外线辐射 (UVA) 和某些药物可引起类似于迟发性皮肤卟啉病的症状，但肝内卟啉水平没有升高，这种状况被称为假性卟啉病。

迟发性皮肤卟啉病的症状

偶发型患者在进入中年前可能不会出现症状。家族型患者可能在儿童期出现症状。

在阳光照射后，症状可能不会立即开始，以致于患者可能没有意识到阳光照射可引起症状。

患有迟发性皮肤卟啉病的患者通常在受阳光照射部位的皮肤（如胳膊、脸，尤其是手掌背面）上出现大小不等的慢性的、反复发作的水疱。水疱之后结痂，产生瘢痕，很长时间才能愈合。皮肤，特别是手部皮肤对很小的外伤都很敏感。



图片

迟发性皮肤卟啉病引起的水疱（有些水疱可见充血）破裂，导致开放性疮口。水疱愈合后结痂，形成瘢痕，皮肤会变脆变薄。

© SPRINGER SCIENCE+BUSINESS MEDIA

有时，阳光照射会引起肿胀、瘙痒或发红。生长在面部和其他暴露于光的部位的毛发有可能增多。有时皮肤会形成深色或浅色斑块。

迟发性皮肤卟啉病的诊断

- 检测血液、尿液和粪便中的卟啉

为了诊断迟发型皮肤卟啉病，医生需要从尿液和粪便中检测出异常升高的卟啉。这种升高的特异性卟啉使医生可以区分迟发性皮肤卟啉病以及其他卟啉病。

医生通常进行检测，以确定导致迟发性皮肤卟啉病的因素，以及明确是否有过多的铁存在于肝脏。如果尚未清楚患者是否患丙型肝炎或HIV感染，医生也会对这些疾病进行检测。

迟发性皮肤卟啉病的治疗

- 放血（静脉切开术）
- 尿中排泄的卟啉增多
- 治疗和治愈丙型肝炎感染（如果存在）

迟发型皮肤卟啉症是最容易治疗的一类卟啉症。避免酒精和其他一些诱导因素是有益的。患者应尽量避免日晒，并应戴帽子、穿好衣服，以防日光暴露。含有氧化锌或氧化钛的防晒霜可能有帮助。阻断紫外线的常见防

防晒霜无效，但是可吸收紫外线 A 的防晒霜（如含二苯甲酰甲烷的防晒霜）可能有效。

对于感染丙型肝炎病毒或 HIV 的患者，使用抗病毒药物治疗这些疾病有助于缓解卟啉病。

放血术

静脉切开放血术是最广泛推荐的一种治疗方法，手术要放出 1 品脱（约半公升）的血。医生通常进行 6-10 次静脉切开术，每两次间隔 2-4 周。通过放血让过量的铁逐渐排出体外，肝内的卟啉原脱羧酶的活性恢复正常，肝和血中的卟啉水平也逐渐下降。皮肤的症状得到改善，逐渐恢复正常。

患者有轻度缺铁时，停止放血。如果次数过多或者过于频繁，可能会引起[贫血](#)。

如果患者正在服用雌激素，医生在静脉切开术完成且卟啉水平恢复正常之前，会停止雌激素治疗（因为雌激素是卟啉病的一个诱因）。

增加卟啉排泄的药物

极低剂量的氯喹或羟氯喹在治疗迟发型皮肤卟啉症时也是有效的。这些药物可增加卟啉通过尿液的排泄，从而清除肝脏中的过多卟啉。然而过高的剂量会导致卟啉排泄过快而引起疾病暂时恶化并且损伤肝脏。

治疗慢性丙型肝炎的药物

几种对慢性丙型肝炎的治疗和治愈非常有效的药物和药物组合，称为直接作用抗病毒药物，正广泛使用。使用这些药物并减少饮酒和戒烟，通常可以同时治疗并治愈肝炎和迟发性皮肤卟啉病。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

[美国卟啉病基金会](#)：旨在对受卟啉病影响的患者及其家人进行教育并提供支持

[卟啉病联合会](#)：为患者及其家庭提供教育和支持；向医疗保健机构提供可靠的信息；促进和支持临床研究，以改善对卟啉病的诊断和管理