



无痛性淋巴细胞性甲状腺炎

作者: [Laura Boucai](#), MD, Weill Cornell Medical College
Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center
已审核/已修订 1月 2026

无痛性淋巴细胞性甲状腺炎是一种无痛的自身免疫性甲状腺炎症，一般发生在产后，通常可自愈。

该病可发生在妊娠期以外，但这种情况不太常见。

(另见[甲状腺概述](#)。)

无痛性淋巴细胞性甲状腺炎最常见于女性，特别是产后 3-4 个月的女性，可出现甲状腺无痛性增大。这种异常往往会在随后的怀孕中复发。

在数周到数月的时间内，患者会先后发生甲状腺过度活跃（[甲状腺功能亢进](#)）和甲状腺不够活跃（[甲状腺功能减退](#)），最后甲状腺功能恢复正常。

无痛性淋巴细胞性甲状腺炎的症状

无痛性淋巴细胞性甲状腺炎通常起病于产后 3-4 个月内。起病后的第一个阶段是甲状腺功能亢进，这时甲状腺变大，但无疼痛或压痛。随后会发生甲状腺功能减退，最后这种病通常自行消退。

首先，出现[甲状腺功能亢进症状](#)，如心率和血压增加、出汗过多和感觉太热、手震颤（颤抖）以及紧张和焦虑。

在第二阶段，出现[甲状腺功能减退症状](#)，这可能包括疲劳、体重增加、便秘、皮肤和头发干燥以及畏寒。

您知道吗.....

- 无痛性淋巴细胞性甲状腺炎中的“无痛性”一词表明，甲状腺炎症不引起疼痛或压痛。
- “淋巴细胞性”是指在用显微镜检查甲状腺组织时观察到的一类白细胞。

无痛性淋巴细胞性甲状腺炎的诊断

- 血液检测甲状腺功能

无痛性淋巴细胞性甲状腺炎的诊断依据是患者的症状、检查和[甲状腺功能血液检查](#)的结果。罕见情况下，医生做甲状腺活检来确诊。

如果女性在怀孕后出现无痛性淋巴细胞性甲状腺炎，医生通常会在患者后续怀孕后检查有无这种病。

无痛性淋巴细胞性甲状腺炎的治疗

- 用 β -阻滞剂治疗甲状腺功能亢进
- 使用甲状腺激素替代疗法治疗甲状腺功能减退

甲状腺功能亢进时可能进行数周的治疗，通常用 β 受体阻滞剂如阿替洛尔治疗。 β 受体阻滞剂有助于控制甲状腺功能亢进的许多症状。例如，这类药物能减慢心率，减少震颤，并控制焦虑。

在甲状腺功能减退期，患者可能要口服甲状腺激素，但通常治疗不超过12个月。但是，有些无痛性淋巴细胞性甲状腺炎患者会发生永久性甲状腺功能减退，这些人需终生补充甲状腺激素。