



单纯性非毒性甲状腺肿

(甲状腺肿；甲状腺功能正常的甲状腺肿)

作者: [Laura Boucai](#), MD, Weill Cornell Medical College

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 1月 2026

单纯性非毒性甲状腺肿是指非癌性甲状腺肿大，不会导致甲状腺激素过量生成或生成不足。

- 非癌性甲状腺肿大可能是因为饮食中缺少碘或摄入某种物质或药物。
- 患者通常没有症状。
- 医生可通过做血液检查来确定甲状腺的健康程度。
- 医生会对肿大的病因进行治疗，但是有时患者需要手术切除部分肿大的甲状腺。

(另见[甲状腺概述](#)。)

甲状腺肿一词有时用来描述任何形式的甲状腺肿大（如炎症或癌症引起的肿大）。单纯性非毒性甲状腺肿是一种特殊形式的非癌性肿大。

在全球大多数地区，**单纯性非毒性甲状腺肿的最常见病因是：**

- 饮食中的碘含量不足 ([缺碘](#))

甲状腺使用碘来合成甲状腺激素。当碘不足时，甲状腺就会增大来试图进行代偿。但在美国和其他有些国家/地区，大部分盐都进行了碘强化，因此，缺碘不是甲状腺肿的常见病因。

单纯性非毒性甲状腺肿的其他病因包括：


- 使用某些药物（如胺碘酮或锂）
- 食用极大量的某些食物（如木薯、西兰花、菜花和卷心菜）

有时，青春期、孕期或更年期甲状腺可暂时性肿大。

出现单纯性非毒性甲状腺肿时，甲状腺会分泌正常量的甲状腺激素，因此患者不会出现甲状腺不够活跃或过度活跃。

单纯性非毒性甲状腺肿的症状

患者通常发现颈部的基部出现肿胀，但没有其他症状。有时，甲状腺肿也会压迫其它组织，导致咳嗽、声音嘶哑、呼吸或吞咽困难。



与[亚急性甲状腺炎](#)患者不同，单纯性非毒性甲状腺肿患者通常不会感觉甲状腺疼痛和触痛。

单纯性非毒性甲状腺肿的诊断

- 血液检测甲状腺功能
- 超声检查和甲状腺扫描

医生通常会做血液检查来确定甲状腺是否正常工作（[甲状腺功能血液检查](#)）。医生会检测血液中甲状腺激素——甲状腺素（T4 或四碘甲状腺原氨酸）和促甲状腺素 (TSH)——的水平。有时，医生还会通过检测查明血液中是否存在攻击甲状腺的抗体（抗甲状腺抗体），出现该抗体即提示存在针对甲状腺的免疫反应，而这类反应会引起炎症。

医生可能会进行一次放射性碘摄取试验和一次[甲状腺扫描](#)。在这些检测中，患者需要吞下（或注射）少量放射性碘。放射性碘积聚在甲状腺。扫描仪就可以监测到多少碘被腺体吸收，γ相机（监测辐射）会拍下甲状腺的照片。这些扫描会显示可能提示 [Graves 病](#)、[甲状腺结节](#)或[甲状腺炎](#)的任何甲状腺形态异常。

医生可能会进行一次超声检查（利用声波生成甲状腺图像），以找出可能癌变的所有结节。

单纯性非毒性甲状腺肿的治疗

- 有时使用碘补充剂
- 有时进行甲状腺激素替代治疗

- 有时需要进行手术

治疗取决于甲状腺肿的大小和原因。

在碘缺乏地区，患者就需要补充碘。可以将碘添加在盐、水、农作物，以消除该地区的碘缺乏。

患者应不再食用抑制甲状腺激素生成的食物，例如木薯、西兰花、菜花和卷心菜。

如果饮食不是病因，则可以给予某些患者左旋甲状腺素来替代甲状腺激素。这种药物可以阻止促甲状腺素的生成，并可使甲状腺肿缩小。

患有非常大的甲状腺肿，可能需要手术切除部分甲状腺或可给予放射性碘缩小足够的腺体，以防止干扰呼吸或吞咽或纠正美容问题。