

某些口服降糖药物的常见副作用

药物	一些副作用
双胍类药物	所有双胍类药物都会导致 • 腹泻 • 体液酸性增加（少见） • 肝功能衰竭（少见）
二甲双胍	—
缓释型二甲双胍	—
磺脲类	所有磺脲类都会导致 • 体重增加 • 低血糖
Acetohexamide	腹泻 恶心 体液潴留（水肿）
氯丙酰胺	低血钠
格列美脲	头晕 头痛
格列吡嗪	腹泻 恶心 低血细胞计数（贫血）
格列吡嗪缓释片	腹泻 恶心
格列本脲	消化不良
微粉化格列本脲	消化不良
妥拉磺脲	恶心 呕吐
甲苯磺丁脲	头痛 低血细胞计数
格列奈类药物	所有氯茴苯酸类都会导致 • 低血糖
那格列奈	体重稍微增加

药物	一些副作用
Repaglinide	—
噻唑烷二酮类药物	所有噻唑烷二酮类都会导致 • 体重增加 • 体液潴留（水肿） • 骨折风险增加
吡格列酮	发生膀胱癌的风险可能增加
罗格列酮	心脏病发作可能增加
α-葡萄糖苷酶抑制剂	所有 α-葡萄糖苷酶抑制剂都会导致 • 腹泻 • 腹痛 • 胃气胀 • 气体相关症候群
阿卡波糖	—
米格列醇	—
二肽基肽酶-4 抑制剂	所有的二肽基肽酶-4 抑制剂都会导致 • 头痛 • 上呼吸道感染 • 增加胰腺发炎（胰腺炎）的风险
阿格列汀	关节疼痛
利拉利汀	腹泻
沙格列汀	关节疼痛
西格列汀	腹泻 关节疼痛
钠-葡萄糖共转运蛋白-2 (SGLT2) 抑制剂	所有钠-葡萄糖共转运蛋白-2 (SGLT2) 抑制剂可能 • 增加排尿 • 引起头晕 • 增加发生生殖器真菌感染和尿道感染的风险 SGLT2 抑制剂可能会 • 增加骨折风险 • 增加发生糖尿病酮症酸中毒的风险 • 使胆固醇水平升高

药物	一些副作用
	增加生殖器周围部位发生危及生命的感染（福尼尔坏疽）的风险
贝格列净	—
卡格列净	截肢（罕见）风险增加
达格列净	—
恩格列净	—
Ertugliflozin	—
在这些主题中 糖尿病的药物治疗 >	

