



专注身体的重复行为障碍

作者: **Katharine Anne Phillips**, MD, Weill Cornell Medical College;

Dan J. Stein, MD, PhD, University of Cape Town

Reviewed By **Mark Zimmerman**, MD, South County Psychiatry

已审核/已修订 11月 2025

专注身体的重复行为障碍患者会反复进行诸如咬指甲、咬嘴唇或咀嚼面颊之类的与身体有关的行为，并反复尝试停止这些行为。

- 专注身体的重复行为障碍患者在咬指甲或咬嘴唇之前可能会感到紧张或焦虑，而这些行为可能会缓解这种感觉。
- 当患者抓搔或咬身体部位的程度足以造成损伤、试图减少或停止该行为但却做不到，并因其行为而感到非常痛苦或功能受损时，医生可诊断该疾病。
- 专门针对专注身体的重复行为障碍的认知行为疗法（习惯逆转治疗），以及药物 *N*-乙酰半胱氨酸 (NAC)、选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂或氯米帕明可能有助于减轻症状。

专注身体的重复行为障碍患者会强迫性地抓搔、拉扯或拖拽其身体的一个或多个部位。他们可能咬指甲或嘴唇、咀嚼面颊或撕扯指甲。

拔毛癖和**皮肤抓搔症**（抓痕症）涉及专注身体的重复行为。在《精神疾病诊断与统计手册》(DSM-5-TR) 中，它们被分类为单独的疾病，但在《国际疾病分类第十一次修订本 (ICD-11)》中作为专注身体的重复行为障碍的副标题。

症状

有些专注身体的重复行为障碍患者会自动进行这些活动，而没有想到它。有些则更为有意识地去。做。

患者并非因为过度关注或担忧其外表而做这些行为（像**躯体变形障碍**那样）。但是，他们在做这些动作之前可能有紧张或焦虑感，而做这些动作能够缓解其情绪。之后，他们往往会有一种满足感。他们可能也会因自己的失控而感到痛苦，并反复尝试停止或减少这种动作，但无法做到。

如果患者经常咬指甲或撕扯指甲，他们的指甲可能会变形。指甲可能会凹陷或凸起，或者指甲下可能会出现积血，形成紫黑色斑块。其他行为可导致出血。

诊断

- 医生根据特定精神病诊断标准进行评估

医生根据以下症状诊断专注身体的重复行为障碍：

- 咬或以其他方式摆弄身体的某一部位，有时会导致躯体损伤
- 反复尝试减少或停止这种动作
- 对这种动作感到极大的痛苦或社会功能受到损害

治疗

- 认知行为疗法（通常是习惯逆转训练）
- 有时使用药物

专门针对此病的认知行为治疗可能有助于减轻症状。最推荐的认知行为治疗类型是习惯消除治疗。这种治疗会教患者做以下事情：

- 更加意识到自己在做什么
- 识别触发专注身体的重复行为的情境
- 使用策略帮助他们阻止自己进行该活动，例如，改为不同的活动（例如握紧拳头、编织或坐在自己手上）

N-乙酰半胱氨酸、美金刚、选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 和氯米帕明，所有这些物质都用于治疗拔毛癖和皮肤抓搔症，有时用于治疗专注身体的重复行为障碍。