



短暂性精神障碍

作者: [Matcheri S. Keshavan](#), MD, Harvard Medical School
Reviewed By [Mark Zimmerman](#), MD, South County Psychiatry
已审核/已修订 7月 2025

短暂性精神障碍的症状类似于妄想、幻觉或[精神分裂症的其他精神病性症状](#)，但它们持续时间更短（从 1 天到 1 个月）。

短暂性精神障碍患者至少有以下症状之一：

- 妄想（即使有强有力的相反证据，也依旧坚持的错误信念）
- 幻觉
- 言语瓦解
- 非常紊乱或紧张型的（无法移动或无反应）行为

如果患者的症状持续不到 1 个月，而没有能够更好地解释症状的其他疾病，医生将诊断为短暂性精神障碍。其他可产生类似症状的疾病包括药物和/或非法药物的不良反应、脑肿瘤或颞叶癫痫等医学问题、[精神分裂症](#)和[分裂情感性障碍](#)。如果这种情况发生在明显的压力发作期间，则称为[短暂反应性精神病](#)。

短暂性精神障碍的治疗类似于[精神分裂症的治疗](#)，需要医生监护，有时需要短期使用[抗精神病药物](#)。

复发很常见，但是短暂性精神障碍患者在发作之间通常功能良好，罕有或没有症状。患有短暂性精神病的人患精神分裂症或[精神分裂症谱系](#)中另一种疾病的风险似乎会增加。