



环性心境障碍

作者: [William Coryell](#), MD, University of Iowa Carver College of Medicine

Reviewed By [Mark Zimmerman](#), MD, South County Psychiatry

已审核/已修订 1月 2026

环性心境障碍常表现为欣快状态（轻躁狂）被悲伤状态（抑郁发作）所替代，两种发作程度均较轻且持续时间短暂。

环性心境障碍的临床表现与[双相障碍](#)类似，但程度较轻。欣快和悲伤程度不严重，仅持续数天，常易复发，且发作间期不规律。它常可发展成为双相障碍或表现为严重的持续性喜怒无常。

对于环性心境障碍患者，情绪高涨发作时的能量可能有助于业务、领导能力、成就和艺术创造力的成功。然而，过度情绪高涨或抑郁或情绪波动也可能导致工作和学习成绩起伏不定，经常变换住所，反复分手或婚姻失败，以及[饮酒](#)或其他[物质使用障碍](#)。

如果患者具有特征性的精神症状表现，医生即可诊断为环性心境障碍。

（另请参阅[心境障碍概述](#)。）

环性心境障碍的治疗

- 教育和支持
- 有时会使用稳定心境的药物

环性心境障碍患者需要学会如何使自己喜怒无常的情绪状态适应环境。但是，想要与环性心境障碍患者维持良好的人际关系是非常困难的。对于环性心境障碍患者来说，获得一份工作时间灵活的工作，或者从事一份与他们的氣質特征相符的职业，或许能让工作变得更容易。

当环性心境障碍影响正常生活时，可使用心境稳定剂（如[锂盐](#)或[抗癫痫药物](#)）进行治疗。相较于锂盐，患者对于抗癫痫药物双丙戊酸钠有更好的耐受性。除非抑郁很严重且持续时间长，否则不将抗抑郁药用于环性心境障碍患者，因为此类药物会使一种情绪迅速转为另一种情况（快速循环）。

团体支持治疗可提供一个分享共同经历和感受的平台，以此提供帮助。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担任何责任。

[抑郁症和双相障碍支持联盟 \(DBSA\)，环性心境障碍](#)