



露阴症

(露阴癖)

作者: [George R. Brown](#), MD, East Tennessee State University

Reviewed By [Mark Zimmerman](#), MD, South County Psychiatry

已审核/已修订 10月 2025 | 修改的 1月 2026

露阴癖是一种通过暴露生殖器产生性兴奋或在性活动过程中强烈渴望生殖器被对方观赏的现象。露阴症是指将露阴冲动或幻想付诸实施，或因这些冲动和幻想而感到苦恼或无法正常工作生活的一种病症。露阴症也可能涉及对未表示同意的人实施露阴行为。

- 大多数露阴者不存在露阴症。
- 当患者因自己的行为而感到非常痛苦或功能受损，或在对未给予同意的人采取露阴行动时，医生诊断其患有露阴症。
- 治疗（通常在露阴者被捕后开始）包括心理治疗、支持团体和某些抗抑郁药。

露阴癖是[性变态](#)的一种。

患者（通常是男性）常出人意料地在陌生人面前暴露自己的生殖器，通过这种行为而产生性兴奋。本病患者可能意识到自己希望看到陌生人被惊吓、被震惊时的表现。受害者往往是女性或异性的儿童。绝大多数有暴露癖的人不会付诸行动（也就是说，他们不会进行具有攻击性的性行为）。但他们对受害者决不会有进一步的接触，所以不会构成强奸。

虽然暴露癖很常见，但暴露癖的真实患病率尚不清楚，据估计男性患病率高达 8% 左右，女性患病率似乎较低（3% 至 6%）。

露阴癖通常始于青春期，但偶尔首发行为可能发生在青春期前或中年。多数露阴癖者会结婚，但婚姻通常不稳定。

30% 的被逮捕的男性性侵犯者是露阴癖患者。他们的行为常持续存在。约有 20-50% 会被再次逮捕。

向不知情的陌生人暴露生殖器以获取性兴奋的行为在女性中极少见。女性露阴癖患者较少，因其可通过其他方式暴露自己，如在不同的媒介和娱乐场所穿着性感的衣服（这种行为越来越多地被社会接受）。参与这类场合本身并不构成性心理障碍。

有些露阴癖者的露阴行为是强烈渴望他人观看其性表演的表现。这些人希望被已给出同意的观众观看，而不是为了惊吓别人。这类露阴癖者可能会拍摄色情电影或成为色情演员。他们极少为自己的欲望感到痛苦或功能损害，因此也不存在心理障碍。

大多数有露阴倾向的人没有障碍，但有些人可能同时患有[人格障碍](#)（通常是[反社会型人格障碍](#)）或[品行障碍](#)。

露阴症的诊断

- 医生根据标准精神病诊断标准进行评估

医生根据以下情况诊断露阴癖

- 人们在性行为中暴露自己的生殖器或被其他人观察到，反复强烈地激起了人们的兴趣，并且在幻想，强烈的冲动或行为中表现出唤起。
- 结果，人们感到非常困扰，或者变得不能很好地工作（在工作中，在他们的家庭中，或者在与朋友的交往中），或者他们对未经同意的人采取了行动。
- 此情况已有 6 个月或更长的时间。

在诊断露阴症时，医生还会明确患者是通过向青春期前儿童还是身体发育成熟者或向这两个群体暴露其生殖器来唤起性欲。

露阴症的治疗

- 心理治疗和互助小组
- 某些抗抑郁药物
- 有时使用其他药物

露阴癖治疗通常在露阴癖者被逮捕后开始实施。心理治疗、支持小组和[选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂类](#) (SSRI) 抗抑郁药物治疗。

如果 SSRI 无效，则可使用能够影响性欲和降低睾酮水平的药物。这些药物包括亮丙瑞林和醋酸甲羟孕酮。这些药物在使用时必须得到使用者的知情同意，医生需定期化验血液，以监测药物对肝脏的影响，另外也要做其他检查（包括骨密度测量和血液睾酮水平测量）。