



恋物症

(恋物癖)

作者: [George R. Brown](#), MD, East Tennessee State University

Reviewed By [Mark Zimmerman](#), MD, South County Psychiatry

已审核/已修订 10月 2025 | 修改的 1月 2026

恋物癖是指将非生命物体（迷恋物）作为唤起性兴奋的首选方式。如果恋物癖者从对非生命物体的使用或对非生殖部位（如足部）的专注中获得反复、强烈的性兴奋，但这种性兴奋给恋物癖者带来显著痛苦，严重影响其日常功能，或伤及或可能伤及其他人时，即视为恋物症。

恋物癖是一种在 19 世纪首次作出描述的性变态。没有人确切知道性变态（恋物癖）如何发展为完全的恋物症。然而，一些科学家认为，当早期非性童年经历在青春期开始后以某种方式与性唤起或性满足联系起来，就会出现这种疾病。

恋物癖者可通过多种方式获得性刺激和性满足，比如：

- 穿另一个人的内衣
- 穿着或佩戴橡胶或皮革
- 抱住、摩擦或闻一些物体，比如高跟鞋

如果性唤起主要来自于穿着异性服装（即异装）而不是以某种其他方式使用服装，则该性变态被视为[异装癖](#)。

恋物癖患者离开迷恋对象可能无法正常发挥性功能。迷恋物可取代与伴侣的正常性活动，也可在伴侣的同意之下融入到性活动中。对迷恋物的需求可能会非常强烈和无法控制，以至于完全支配乃至破坏一个人的正常生活。但大多数恋物癖者的行为达不到恋物症的诊断标准，因为它们不导致显著痛苦，不妨碍日常功能，也不伤及他人。

恋物症的治疗

- [心理治疗](#)
- 药物，如一种称为[选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂](#) (SSRI) 的抗抑郁药

治疗恋物癖的效果有限。治疗可能包括心理治疗和 SSRI，它们在寻求治疗的患者中使用效果有限。与大多数其他性变态一样，很少有患者自愿寻求专业帮助。

