



疾病

进食和饮食障碍概述

作者: [Evelyn Attia](#), MD, Columbia University Medical Center;

[B. Timothy Walsh](#), MD, College of Physicians and Surgeons, Columbia University

Reviewed By [Mark Zimmerman](#), MD, South County Psychiatry

已审核/已修订 8月 2025 | 修改的 10月 2025

进食和饮食障碍是指进食或与进食相关行为的紊乱，通常涉及

- 进食种类或进食量的改变
- 采取措施防止食物的吸收（例如自我催吐或服用泻药）

异常进食行为在达到以下标准时可视为进食障碍：持续一定时间且严重损害患者的身体健康和/或工作学习，或对患者的人际交往产生不良影响。

进食和饮食障碍包括：

- [异食癖](#)
- [反刍症](#)
- [回避性/限制性摄食障碍](#)
- [神经性厌食症](#)
- [神经性贪食症](#)
- [暴食性障碍](#)



图片

版权所有 © 2025 MERCK & CO., INC., RAHWAY, NJ, USA（美国）及其附属公司。保留所有权利。

异食癖是指经常食用非食物的物质或物品。

反刍症的特征是食物吃进去以后又反流出来。

回避性/限制性摄食障碍的特征是，患者进食量极小和/或避免进食某些食物，但并不存在神经性厌食症或神经性贪食症患者所常有的体型或体重担忧。通常，患有这种疾病的人可能缺乏进食兴趣，对食物极度挑剔，并可能回避某种类型的食物。例如，他们可能回避某种颜色、粘稠度或气味的食物。有些人害怕进食可能会造成不良后果，如窒息或呕吐。

神经性厌食症的特点是，坚持不懈地追求苗条，对自身像认识歪曲，极度害怕肥胖，限制食物摄入，导致体重显著下降。神经性厌食症患者会限制食物摄入，但也可能会暴食，然后通过清除来补偿（例如，让自己呕吐或使用泻药）。患者可能会限制食物摄入，以至于损害到健康。虽然厌食症的意思是食欲下降，但许多神经性厌食症患者可能在营养严重不良之前并未失去食欲。

神经性贪食症的特征是反复地快速进食大量食物，并伴随弥补进食过多的行为。例如，患者可能会让自己呕吐或服用泻药。

暴食性障碍的特征是，患者的摄食量异常偏高，大大超过相同情形下相同时间内大多数患者所摄入的食物量。患者在暴食过程中和暴食后出现失控感，对暴食发作感到痛苦。暴食之后不会随之进行清除或弥补进食过多的其他尝试。

进食和饮食障碍在女性中比在男性中普遍的多，尤其是年轻女性。

进食和饮食障碍的病因

关于进食和饮食障碍的成因，目前所知甚少。这些疾病大多在女性中更为常见。某些家庭因素或社会对身体形象的规范可能起到一定作用，研究发现神经性厌食症存在遗传易感性。

了解更多信息

以下是一些可能有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

[美国进食障碍帮助协会 \(NEDA\)](#)

[美国国家神经性厌食症和相关疾病协会 \(ANAD\)](#)

[美国国立精神研究卫生研究所 \(NIMH\)，进食障碍](#)