



恋童症

(恋童癖)

作者: [George R. Brown](#), MD, East Tennessee State University

Reviewed By [Mark Zimmerman](#), MD, South County Psychiatry

已审核/已修订 10月 2025 | 修改的 1月 2026

恋童症的特点是，对儿童（通常为 13 周岁或以下）反复地强烈地表现出性的兴趣，包括性幻想、性冲动或性行为。

- 恋童癖患者可能对男童、女童或两者均感兴趣；可能只对儿童感兴趣，或对儿童和成人都感兴趣。
- 当患者因为对儿童感兴趣或采取了行动，而感到非常痛苦或者社会功能受损时，医生诊断为恋童癖。
- 恋童癖可采用长期心理治疗以及改变性欲和降低睾酮水平的药物进行治疗。

(另请参见[儿童忽视和虐待概述](#)。)

恋童癖是[性变态](#)的一种。由于它会对他人造成伤害，所以被视为一种病症。

两个人之间的性兴趣或性关系是否属于恋童症，要取决于当事人的年龄。在西方社会，恋童症的诊断标准是，恋童者必须不低于 16 岁，且比性幻想或性活动的对象至少大 5 岁。不过，一个大龄青少年（17-18 岁）与一个 12 或 13 岁儿童发生的性关系不一定属于恋童症。界定这类活动是否属于犯罪时，各种文化背景下的年龄标准可能不同。

虽然在美国各州的法律不尽相同，但法律通常认为年满 18 周岁，且受害者不及 16 周岁的，在法律上构成强奸罪。法律上的强奸罪与恋童癖的定义不相符，强调在医学上或法律上选择特定年龄作为区别点。在许多地方（包括在美国的某些州），年龄在 12~14 岁的儿童可合法结婚，这导致恋童癖和法定强奸的定义进一步复杂化。

恋童癖在男性较女性更为常见。

恋童癖患者可能对男童、女童或两者均感兴趣。女孩或男孩是否更可能成为恋童癖者的受害者尚不清楚，尽管女孩似乎更可能成为性虐待的受害者。

本病患者通常是孩子的熟人，家庭成员，继父（母）或权威人士（如老师或教练）。有些则仅对自己家族内的儿童感兴趣（乱伦）。有些恋童癖者仅对儿童感兴趣，常常是特定年龄段或发育阶段的儿童。其他恋童癖者则对儿童和成人均感兴趣。

视觉骚扰或普通接触似乎比接触生殖器或发生性交更为常见。

攻击型恋童癖者可能会强迫或胁迫儿童与其发生性行为，并威胁儿童不可告知他人，否则会伤害他们或他们的宠物。很多这类恋童癖者存在[反社会型人格障碍](#)。

许多恋童癖者都有或存在[物质使用障碍或依赖](#)，以及[抑郁](#)。他们常出身于问题家庭，且出现婚姻冲突的比例较高。很多在幼年时都曾受过性虐待。

恋童症的诊断

- 医生根据标准精神病诊断标准进行评估

医生根据以下情况诊断恋童癖

- 对一名或更多儿童（通常为 13 周岁或以下）反复地强烈地表现出性兴趣，包括性幻想、性冲动或性行为。
- 患者感到非常苦恼，或者功能受损（在工作中、在家中或在与朋友的交往中），或者他们已经按照他们的愿望行事。
- 患者不低于 16 岁，且比性幻想或性活动的对象至少大 5 岁。（例外情况是年龄较大的青少年，与 12 或 13 岁儿童处于持续的恋爱关系。）
- 此情况已有 6 个月或更长的时间。

恋童症的治疗

- 单人式和/或小组式心理治疗
- 治疗其他疾病
- 药物

恋童癖可采用长期单人式或小组式心理疗法以及降低睾酮水平从而降低性欲的药物进行治疗。这些药物包括亮丙瑞林和醋酸甲羟孕酮。这些药物在使用时必须得到使用者的知情同意，医生需定期化验血液，以监测药物对肝功能的影响，另外也要做其他检查（包括骨密度测量和血液睾酮水平测量）。

治疗效果因人而异。当患者自愿接受治疗和社会技能训练时，并同时治疗伴随的其他问题如药物误用或抑郁，常可获得令人满意的效果。而仅是因犯罪被逮捕或被判刑后而被迫接受治疗，通常效果不佳。

简单地将恋童癖者放入监狱或其他机构，即使很长时间，也不会改变恋童癖的欲望或幻想。然而，一些愿意接受长期监测治疗（通常包括药物）的被困禁恋童癖者可以避免恋童癖活动并重新融入社会。

药物

- 醋酸甲羟孕酮，以肌肉注射方式给药
- 其他类别的药物

醋酸甲羟孕酮（一种孕酮）类似于女性激素黄体酮。替代品是亮丙瑞林。这两种药物均可阻止垂体向睾丸发送生成睾酮的信号。因此，它们可降低睾酮水平和性欲。醋酸环丙孕酮是另一种降低睾酮水平（使其保持在女性正常水平范围内）的药物，但在美国不可用。医生需定期化验血液，以监测这些药物对肝功能的影响，另外也需做其他检查（包括骨密度测量和血液睾酮水平测量）。但是对于女性恋童癖者这些药物的效果仍不清楚。

抗抑郁药物选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 可能也有帮助。这类药物有助于控制性冲动和性幻想。它们也可降低性欲，并可导致勃起功能障碍。

药物治疗与心理治疗（特别是，认知行为治疗）以及社交技能训练联合使用更有效。