



## 反刍症

作者: [Evelyn Attia](#), MD, Columbia University Medical Center;  
[B. Timothy Walsh](#), MD, College of Physicians and Surgeons, Columbia University  
Reviewed By [Mark Zimmerman](#), MD, South County Psychiatry  
已审核/已修订 8月 2025

反刍症是一种**进食/饮食障碍**，其特征是食物吃进去以后又反流出来。反流可能是自发的。

- 有些反刍症患者知道该行为是社会不可接受的，并试图掩盖或隐藏。
- 如果患者限制了他们的食物摄入量（避免其他人看到反流），他们可能会体重减轻或出现营养缺乏。
- 若患者报告称反复反流食物一个月或以上，医生将诊断为反刍症。
- 行为矫正疗法可能有所帮助。

本病患者反复出现进食后的食物反流，通常每天都出现。他们没有恶心。患者可能会重新咀嚼反流回的食物，然后吐掉或咽下去。

反刍症可发生于婴幼儿、儿童、青少年或成人。它既被视为一种精神疾病，也属于“功能性”胃肠疾病（亦称肠脑相互作用障碍）。

与呕吐不同，呕吐是强烈的，且通常是由疾病导致的；而反流则并不强烈，且可能是自发的。不过，患者可能会报告自己无法阻止自己的这一行为。

有些患者意识到他们的行为不被社会所接受，所以会通过用手捂嘴或咳嗽来掩盖。有些患者避免与他人一同进餐，也不在社交场合或工作场合进餐，以免在公开场合发生反流。

有些患者则限制自己的进食量。吐掉反流食物的患者或过度限制进食量的患者可能会出现体重减轻或营养不良。

## 反刍症的诊断

- 医生根据标准精神病标准进行评估

医生通常对以下情况诊断反刍症

- 患者反复反流食物 1 个月或以上。
- 已排除可能导致反胃的胃肠道疾病（如[胃食管反流](#)、[Zenker 憩室](#)）以及其他进食和饮食障碍（如[神经性厌食症](#)和[神经性贪食症](#)）。

医生可能会观察患者反流食物，或者患者可以报告。

如果医生怀疑或确诊反刍症，他们会评估患者的[营养状况](#)，以确认是否存在体重减轻和营养不良。

## 反刍症的治疗

- 行为矫正治疗

[行为矫正治疗](#)（包括采用认知行为策略的治疗）对本病可能有帮助。行为矫正疗法可帮助人们消除不理想的行为，同时学习更好的行为。

## 了解更多信息

以下是一些可能有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

[美国进食障碍帮助协会 \(NEDA\)](#)

[美国国家神经性厌食症和相关疾病协会 \(ANAD\)](#)