



分裂情感性障碍

作者: [Matcheri S. Keshavan](#), MD, Harvard Medical School
Reviewed By [Mark Zimmerman](#), MD, South County Psychiatry
已审核/已修订 7月 2025 | 修改的 1月 2026

分裂情感性障碍以心境障碍为主，例如[抑郁或躁狂](#)，同时伴随有[精神分裂症的精神病症状](#)。

精神病是指妄想、幻觉、思维和言语紊乱等症状，以及表明与现实失去联系的异常和不恰当的行为（包括紧张症）。情感是指人的感情和情绪。

当患者同时具有精神病症状和心境症状（如抑郁或躁狂）时，医生会考虑分裂情感性障碍。心境症状应在疾病的活动期和残余期的大部分时间内（即总病程的一半以上）出现，并伴有以下两种或两种以上的精神分裂症症状：

- 妄想
- 幻觉
- 言语瓦解
- 杂乱异常的行为
- 阴性症状（极少表达或不表达情绪、言语减少、无法感到愉快、对人际关系缺乏兴趣）

医生为了将分裂情感性障碍和[精神分裂症](#)与[心境障碍](#)作出区分，可能需要对患者的症状及其进展性质进行长期评估。精神分裂症患者一定在两周内出现幻觉或妄想，且没有严重的躁狂或抑郁发作。

分裂情感性障碍的治疗

- 药物、心理治疗和社区支持

由于分裂情感性障碍常导致长期残疾，患者需要全面治疗，包括[抗精神病药物](#)、心理治疗和社区支持。