



为受自杀影响者提供支持

作者: [Christine Moutier](#), MD, American Foundation For Suicide Prevention

Reviewed By [Mark Zimmerman](#), MD, South County Psychiatry

已审核/已修订 7月 2025

自杀是由故意的致死性自残而造成的死亡。任何自杀行为都会对相关人员产生巨大的情绪影响。自杀者的家人、朋友、医师都可能因为没能阻止其自杀行为而觉得有罪、羞愧和自责。也可能对自杀者感到愤怒。最终，他们可能会处理好这些复杂的悲伤体验，并妥善应对自杀者的去世。

有时，悲伤咨询师或支持团体将有助于家人和朋友走出负罪感和悲哀的阴影。初级保健医生或当地心理健康机构（郡或州一级）通常可以帮助找到这些资源。此外，[美国自杀预防基金会](#)等全国性机构也负责维护当地的自杀去世者的遗属支持团体的名录。网络上也有可用的资源。

自杀企图造成的影响与自杀相似。然而，家庭成员和朋友有机会通过更多地了解自杀、心理健康治疗以及对个人提供支持和响应的方式来舒缓他们的感受。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

[988 自杀与危机求助热线](#)

[美国自杀预防基金会 \(AFSP\)](#)

[青少年自杀预防蓝图](#)

[美国疾病控制与预防中心，自杀预防](#)

[儿童、青少年与自杀去世](#)

[危机短信热线](#)

[Now Matters Now](#)

[Psych Hub 教育视频库](#)

[物质滥用和精神健康服务管理局 \(SAMHSA\) 治疗查询部](#)

[自杀预防资源中心](#)

[自杀去世者遗属：资源和愈合指南](#)