



窥阴症

(窥阴癖)

作者: [George R. Brown](#), MD, East Tennessee State University

Reviewed By [Mark Zimmerman](#), MD, South County Psychiatry

已审核/已修订 10月 2025 | 修改的 1月 2026

窥阴癖指通过观看不知情的人脱衣服、裸体或进行性行为而产生性兴奋。窥阴症是指将窥阴冲动或幻想付诸实施，或因这些冲动和幻想而感到苦恼或无法正常工作生活的一种病症。

- 大多数有窥阴倾向的人并不存在窥阴症。
- 当人们因为他们的行为而感到非常痛苦或者变得不能很好地工作时，或者他们已经对未经同意的人采取了行动，医生将诊断为偷窥症。
- 治疗通常在窥阴者被逮捕后开始，包括心理治疗、互助小组和某些抗抑郁药。

窥阴癖是[性变态](#)的一种。大多数有窥阴倾向和行为（窥阴癖）的人没有窥阴症。

患者仅通过观看（窥视）而获得性兴奋，而不是与被观看者有进一步的性活动。偷窥者并不寻求与被偷窥者发生性接触，尽管他们可能会在偷窥活动期间或之后手淫。偷窥者在公共场合窥视毫不知情的人并/或手淫时，可能会触犯法律。

本病常于青少年或成年早期起病。在男孩或成年男子中，一定程度的窥阴行为较常见。男性同性恋者中轻度的窥阴行为被社会视为正常行为。私下里在网络上观看色情图片和视频不属于窥阴癖，因其缺少本病的特征性因素，即偷偷地观看。然而，监控摄像机的小型化和手机摄像机的广泛使用导致了“视频窥阴”，这包括对未给出同意的人拍摄脱衣或性活动视频。这种活动越来越常见，在大多数国家通常被视为犯罪。

窥阴症是最常见的性变态之一，在男性中更为常见。男性与女性窥阴癖者之间的比率在 2:1 到 3:1 之间。人们对窥阴症知之甚少，有关信息主要来自于因这种行为而被监禁的人。许多罪犯也可能有过度性行为，并有任何其他或许多心理健康疾病，包括[露阴症](#)、[抑郁](#)、[品行障碍或反社会型人格障碍](#)。他们通常情绪调节和应对能力差，性欲亢进，人际关系困难，并有多生活压力因素。

当窥阴癖是一种疾病时，偷窥者花费大量时间寻找偷窥的机会。这可能会导致他们忽略人生中的一些重要事情，不能履行自己的职责。他们可能将窥阴作为首选的性活动方式，并花费大量时间窥视。

窥阴症的诊断

- 医生根据标准精神病诊断标准进行评估

医生根据以下情况诊断窥阴症

- 患者通过观察裸体，脱衣或从事性活动的毫无戒心的人而反复强烈地激起了性兴奋，并已通过幻想，冲动或行为所表达。
- 结果，患者感到非常困扰，或者功能受损（在工作中，在他们的家庭中，或在与朋友的交往中），或者他们已经对未经同意的人采取行动。
- 此情况已有 6 个月或更长的时间。

虽然窥阴癖可能始于青春期或成年早期，但对 < 18 岁的患者未正式诊断窥阴症。

窥阴症的治疗

- 心理治疗和互助小组
- 某些抗抑郁药物
- 有时使用其他药物

治疗通常在窥阴癖者被逮捕后开始实施。心理治疗、支持小组和[选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂类](#) (SSRI) 抗抑郁药物治疗。

如果这些药物无效且病情严重，则可使用能够降低睾酮水平从而降低性欲的药物。这些药物包括亮丙瑞林和醋酸甲羟孕酮。这些药物在使用时必须得到使用者的知情同意，医生需定期化验血液，以监测药物对肝功能的影响，另外也要做其他检查（包括骨密度测量和血液睾酮水平测量）。