

人格和行为改变的某些病因和特征

病因	临床特征*	检查
精神疾病		
<u>双相情感障碍</u>	症状时而发作并持续几周到几个月，包括躁狂（情绪或能量水平异常升高）、抑郁，或两者皆有躁狂发作： • 兴高采烈或烦躁不安 • 夸大（夸张吹嘘自己的优越感、权力、知识或身份） • 饶舌 • 活动增加 • 对睡眠的需求减少 • 思维跳跃，从一个想法跳到另一个 • 有时幻觉或被害妄想 抑郁症的发作： • 感到内疚或毫无价值 • 悲伤、绝望和悲观的情绪 • 通常使之愉悦事情的兴趣丧失 • 精神不振 • 睡眠过多或睡眠困难 • 死亡或自杀的念头	医生的检查
<u>抑郁症</u>	如双相障碍中描述的抑郁症发作（见上文），但没有躁狂史	医生的检查
<u>精神分裂症</u>	通常症状发展缓慢，最初表现为轻度思维混乱和难以应付日常事务 随后出现的症状： • 妄想和／或幻觉 • 常常缺乏兴趣和缺乏情感反应	医生的检查
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。		
CT=计算机断层扫描；EEG=脑电图；IQ=智商；MRI=磁共振成像；PET=正电子发射计算机断层显像。		

病因	临床特征*	检查
	• 思维和行为越来越混乱 • 维持人际关系和就业困难	
药物或物质使用		
使用非法或娱乐性药物，尤其是 • 饮酒 • 安非他明类 • 可卡因 • 致幻剂 • 苯环己哌啶 (PCP)	躁动，有时惊慌或有攻击性 有时有幻觉 长期使用酒精： • 有时平衡问题 • 眼睛抽搐 • 不正常的行走方式 长期使用安非他明： • 有时候偏执 短期过度使用安非他明或可卡因： • 增加心率 • 有时发热	医生的检查 有时血液或尿液化验来发现药物 有时 EEG （记录脑电活动）
停用某种药物，尤其是 • 饮酒 • 巴比妥类药物 • 苯二氮草类药物	通常有显著的意识错乱或谵妄 颤抖（震颤）、头痛、出汗、发热、快速心率或心悸 有时癫痫发作、幻觉和睡眠障碍 削减或停用药物后发病	医生的检查 有时会进行血液或尿液化验来检测药物
药物的副作用	各不相同，取决于药物 有抗胆碱能作用的药物，例如 • 便秘 • 视力模糊 • 头晕目眩 • 难以开始和停止排尿 • 口干	医生的检查 有时停用药物以观察症状是否消失
大脑（神经系统）疾病		
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。		
CT=计算机断层扫描；EEG=脑电图；IQ=智商；MRI=磁共振成像；PET=正电子发射计算机断层显像。		

病因	临床特征*	检查
阿尔茨海默病	症状进展缓慢 丧失短期记忆，很难找到合适的词语，判断力差 完成日常活动困难（如结算支票簿或在他们的邻居周围找到自己的路） 通常发生于高于 60 岁的人群	医生的检查 通常行脑部 CT 、 MRI ，或 PET 精神功能的详细测试，涉及一系列问题和任务（神经心理测试）
脑部感染，如 • 脑炎（例如单纯疱疹性脑炎） • 脑膜炎	头痛 通常意识混乱和发热 当医生将颈部向前弯曲时出现疼痛和／或僵硬（更多见于脑膜炎） 单纯疱疹病毒性脑炎，不良气味的幻觉以及有时癫痫发作	脊椎穿刺（腰穿） 通常行脑部 CT 或 MRI 以血、尿和喉咙中的物质为样本进行培养 EEG
头部外伤 （如 脑震荡后综合征 ）	健忘和头痛 严重头部受伤后的几周情绪不稳定	脑部 CT 或 MRI 智商和行政职能测试，如计划和解决问题的能力（神经认知测试）
脑肿瘤 或 脑部出血 （脑出血）	对于脑肿瘤，头痛逐渐进展，往往是在夜间或清晨以及平躺时加重 对于脑出血，头痛突然开始（称为雷击样头痛） 通常有意识错乱和嗜睡 有时癫痫发作	脑部 CT 或 MRI
多发性硬化症	无力和／或麻木在身体不同的部位退而复现 有时视力部分丧失或复视 有时高温时症状可恶化（如温水浴或炎热的天气）	脑和脊髓的 MRI 有时 脊椎抽液 神经传导检查 （测量神经传输信号速度）和肌电图（刺激肌肉和记录其电活动）
帕金森病	当他们在静止状态时出现手和手指震颤 僵硬和移动及保持平衡困难	医生的检查
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。		
CT=计算机断层扫描；EEG=脑电图；IQ=智商；MRI=磁共振成像；PET=正电子发射计算机断层显像。		

病因	临床特征*	检查
	言论迟缓和面部表情受限	
癫痫（通常是复杂部分性发作）	异常行为的发作 通常意识混乱和凝视 有时不自主的咀嚼，咂着嘴唇， 和无目的的肢体动作 通常情况下没有意识丧失以及身 体没有整体摇晃（抽搐） 有时幻觉出现气味或味道	脑的磁共振成像 EEG
中风	突然出现的症状 通常有一侧肢体的无力或偏瘫以 及行走不稳	脑部 CT 或 MRI
全身（系统）疾病		
低血糖症（血糖水平低）	无力、大汗淋漓和意识混乱 几乎都是发生在用降糖药的患者 中	测量血糖（葡萄糖）水平的检查
肾衰竭	腿部肿胀、食欲减退，以及恶心 通常在几周内出现无力	血液和尿液检查去评估肾脏的功 能是否良好
肝功能衰竭	皮肤和／或白眼球发黄（黄疸） 通常有腿部和／或腹部肿胀 小点状的红紫色皮疹（瘀点） 通常发生于已经知道有肝脏疾病 的患者	血液检查评估肝脏的功能是否良 好（肝功能检查）
系统性红斑狼疮（狼疮）	通常关节疼痛、肿胀 经常有皮疹，尤其在面部或暴露 于阳光下的区域 有时有头痛	血液化验检查特定的抗体
甲状腺疾病，包括 - 甲状腺机能亢进（甲状腺过度活跃） - 甲状腺机能减退（甲状腺活动不足）	甲状腺功能亢进的典型症状： 心悸、出汗过多、难以容忍的 热、食欲增加、体重减轻、颤抖 （震颤），有时眼球凸出 甲状腺功能减退的典型症状： 疲劳、便秘、难以容忍寒冷、食	血液检查评估甲状腺功能是否良 好
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。		
CT=计算机断层扫描；EEG=脑电图；IQ=智商；MRI=磁共振成像；PET=正电子发射计算机断层显像。		

病因	临床特征*	检查
	欲下降、体重增加、讲话缓慢、呆滞、面部浮肿、眼睑下垂、皮肤粗糙且又厚又干、眉毛损失	
维生素缺乏，如 硫胺素 或 维生素B12 缺乏	定向力障碍、记忆力减退、烦躁 手和脚的感觉异常 其他症状取决于哪一种维生素缺乏	血液化验测量维生素水平
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。		
CT=计算机断层扫描；EEG=脑电图；IQ=智商；MRI=磁共振成像；PET=正电子发射计算机断层显像。		
在这些主题中 人格与行为的改变 >		

