

抗精神病药物

药物	一些潜在副作用	注释	
第一代抗精神病药物			
氯丙嗪 氟奋乃静* 氟哌啶醇* Loxapine 茚酮 奋乃静 匹莫齐特 硫利达嗪 硫塞吩 三氟拉嗪	口干 视力模糊 癫痫发作 心动过速和血压下降 便秘 突然发生但可逆的震颤、肌肉僵硬，可进行性发展为肌肉强直 面部或手臂的不自主运动（迟发性运动障碍） 肌肉强直、发热、血压升高、精神症状（ 抗精神病药物恶性综合征 ）	不良作用较常发生于老年人、平衡功能受损或有严重疾病的人。 在服用硫利达嗪期间，建议做眼科检查和心电图 (ECG)。	
第二代抗精神病药物			
阿立哌唑* 阿塞那平 Brexipiprazole 卡比拉嗪 氯氮平 伊潘立酮 卢美哌隆 鲁拉西酮 奥氮平* 帕利哌酮* Pimavanserin Quetiapine 利培酮* Ziprasidone	头昏和体重增加（最常见）是重要的不良作用 部分药物会增加腹部脂肪堆积、血液胆固醇水平异常、高血压和胰岛素抵抗（ 代谢综合征 ）发生的风险		这类抗精神病药物较少引起震颤、肌肉僵硬、不自主运动（包括迟发性运动障碍）和 神经阻滞剂恶性综合征 ，但可能会出现其他副作用。 氯氮平 可导致骨髓抑制、白细胞减少和抽搐，所以较少使用。然而，该药物通常对其他抗精神病药物不起作用的患者有效。 氯氮平 和 奥氮平 最易导致体重增加，而 阿立哌唑 最少导致。 齐拉西酮 不导致体重增加，但可导致心电图异常。 阿立哌唑 、 依匹哌唑 、 卡利拉嗪 和 齐拉西酮 较少导致代谢综合征。 Lumateperone 具有较低的运动和代谢副作用风险
毒蕈碱受体激动剂			
* 对于使用口服药物有困难的患者，可以使用长效肌内 (IM) 注射剂。			

药物	一些潜在副作用	注释
Xanomeline-Trospium		可见胃肠道副作用（恶心、呕吐、便秘）和抗胆碱能副作用（如视物模糊）。
* 对于使用口服药物有困难的患者，可以使用长效肌内 (IM) 注射剂。		
在这些主题中 抗精神病药物 >		

