

治疗焦虑障碍的药物

药物	临床应用	一些副作用	注释
苯二氮草类药物			
阿普唑仑 氯氮卓 氯硝西泮 Clorazepate 安定 劳拉西泮 奥沙西泮	广泛性焦虑障碍 惊恐障碍 恐惧障碍	嗜睡、记忆问题、共济失调、反应迟缓 可能导致药物依赖	最常用的抗焦虑药物 通过减少脑区神经活性而使精神和躯体放松 起效快，有时可在 1 小时内起效 不应与导致嗜睡的其他药物一起使用
Buspirone	广泛性焦虑障碍	晕厥和头痛	不会引起困倦或与酒精产生相互作用 不会引起药物依赖 起效缓慢，可能需要数周
抗抑郁药*			
SSRI（如依他普仑） SNRI（如文拉法辛） 单胺氧化酶抑制剂（MAOI） TCA（如氯丙咪嗪）	广泛性焦虑障碍 惊恐障碍 恐惧障碍 创伤后应激障碍	参见表格 用于治疗抑郁症的药物	参见表格 用于治疗抑郁症的药物
其他抗焦虑药物			
Buspirone	广泛性焦虑障碍	晕厥和头痛	不会引起困倦或与酒精产生相互作用 不会引起药物依赖 起效缓慢，可能需要数周
* 不同抗抑郁药其临床适应症不同。 MAOI = 单胺氧化酶抑制剂；SNRI = 选择性去甲肾上腺素再摄取抑制剂；SSRI = 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂；TCA = 三环类抗抑郁药。			

在这些主题中
[焦虑障碍概述 >](#)

