

Modul 08 - Simple Linear Regression

Roni Yunis

12/04/2023

Pengantar

Regresi linear sederhana adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan linier antara satu variabel bebas (independen) dengan satu variabel terikat (dependen). Dalam konteks ini, “linier” mengacu pada hubungan garis lurus antara variabel-variabel tersebut.

Dalam persamaan regresi linear sederhana, dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

- Y adalah variabel terikat (dependen).
- X adalah variabel bebas (independen).
- β_0 adalah intercept (konstanta).
- β_1 adalah koefisien regresi yang mengukur tingkat perubahan dalam Y untuk setiap satu unit perubahan dalam X .
- ε adalah kesalahan acak yang tidak dapat dijelaskan oleh model dan diasumsikan mengikuti distribusi normal dengan mean nol.

Tujuan utama dari regresi linear sederhana adalah menemukan nilai-nilai β_0 dan β_1 yang meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan (sum of squared errors) antara nilai prediksi yang diberikan oleh model dan nilai aktual dari variabel terikat.

Regresi linear sederhana dapat digunakan untuk memahami dan memodelkan hubungan antara dua variabel, serta melakukan prediksi berdasarkan data yang ada. Metode ini umum digunakan dalam statistika dan analisis data.

Contoh:

Anggaplah Anda bekerja dalam sebuah perusahaan ritel dan Anda ingin memahami hubungan antara jumlah uang yang dihabiskan oleh pelanggan dalam satu transaksi X dengan total pendapatan penjualan Y pada transaksi tersebut. Anda dapat menggunakan regresi linear sederhana untuk memodelkan hubungan tersebut.

Contoh Persamaan Regresi Linear Sederhana:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

- Y : Total pendapatan penjualan dalam satu transaksi.
- X : Jumlah uang yang dihabiskan oleh pelanggan dalam satu transaksi.
- β_0 : Intercept (konstanta), mewakili pendapatan penjualan yang dihasilkan ketika X sama dengan nol.
- β_1 : Koefisien regresi, menunjukkan seberapa banyak pendapatan penjualan meningkat untuk setiap peningkatan satu unit dalam X .

- ε : Kesalahan acak.

Anda mengumpulkan data dari sejumlah transaksi dan kemudian menggunakan regresi linear sederhana untuk mengestimasi nilai β_0 dan β_1 . Setelah memperoleh model regresi, Anda dapat menggunakannya untuk membuat prediksi. Misalnya, jika seorang pelanggan menghabiskan \$50 dalam transaksi, berapa total pendapatan penjualan yang diperkirakan?

Contoh Implementasi dengan R

Load Packages

```
#Split dataset
library(caTools)
```

```
## Warning: package 'caTools' was built under R version 4.3.2
```

```
#Predicting result visualization
library(ggplot2)
```

```
## Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.3.2
```

```
#Import dataset marketing pada library datarium
library(datarium)
```

```
## Warning: package 'datarium' was built under R version 4.3.2
```

View dataset

```
head(marketing)
```

```
##  youtube facebook newspaper sales
## 1  276.12    45.36    83.04 26.52
## 2   53.40    47.16    54.12 12.48
## 3   20.64    55.08    83.16 11.16
## 4  181.80    49.56    70.20 22.20
## 5  216.96    12.96    70.08 15.48
## 6   10.44    58.68    90.00  8.64
```

Melihat dimensi dari data, dengan menggunakan fungsi `dim()`

```
dim(marketing)
```

```
## [1] 200  4
```

Melihat struktur dari data, dengan menggunakan fungsi `str()`

```
str(marketing)
```

```
## 'data.frame':    200 obs. of  4 variables:
## $ youtube : num  276.1 53.4 20.6 181.8 217 ...
## $ facebook : num  45.4 47.2 55.1 49.6 13 ...
## $ newspaper: num   83 54.1 83.2 70.2 70.1 ...
## $ sales    : num   26.5 12.5 11.2 22.2 15.5 ...
```

Exploratory Data Analysis

```
summary(marketing)
```

```
##      youtube      facebook      newspaper      sales
## Min.   : 0.84   Min.   : 0.00   Min.   : 0.36   Min.   : 1.92
## 1st Qu.: 89.25   1st Qu.:11.97   1st Qu.: 15.30   1st Qu.:12.45
## Median :179.70   Median :27.48   Median : 30.90   Median :15.48
## Mean   :176.45   Mean   :27.92   Mean   : 36.66   Mean   :16.83
## 3rd Qu.:262.59   3rd Qu.:43.83   3rd Qu.: 54.12   3rd Qu.:20.88
## Max.   :355.68   Max.   :59.52   Max.   :136.80   Max.   :32.40
```

```
cor(marketing)
```

```
##      youtube      facebook      newspaper      sales
## youtube    1.00000000  0.05480866  0.05664787  0.7822244
## facebook   0.05480866  1.00000000  0.35410375  0.5762226
## newspaper  0.05664787  0.35410375  1.00000000  0.2282990
## sales      0.78222442  0.57622257  0.22829903  1.0000000
```

Sekarang kita akan mencoba melihat korelasi antara facebook dengan sales

```
#menghitung korelasi antar variabel
korfacebook <- cor(marketing$facebook, marketing$sales)
korfacebook
```

```
## [1] 0.5762226
```

Koefisien korelasi mengukur tingkat hubungan antara dua variabel x dan y. Nilainya berkisar antara -1 (korelasi negatif sempurna: ketika x meningkat, y menurun) dan +1 (korelasi positif sempurna: ketika x meningkat, y meningkat).

Nilai yang mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah antara variabel. Korelasi yang rendah (-0,2 < x < 0,2) mungkin menunjukkan bahwa banyak variasi dari variabel hasil (y) tidak dijelaskan oleh prediktor (x). Dalam kasus seperti itu, kita mungkin harus mencari variabel prediktor yang lebih baik.

Dalam contoh ini, koefisien korelasinya antara variabel facebook dan sales adalah sebesar 0,57

Bagi dataset kedalam data training dan data testing

```
splitdata <- sample.split(marketing$sales, SplitRatio = 0.7)
trainingset <- subset(marketing, splitdata == TRUE)
testingset <- subset(marketing, splitdata == FALSE)
```

```
dim(trainingset)
```

```
## [1] 140  4
```

```
dim(testingset)
```

```
## [1] 60  4
```

Bisa dilihat bahwa untuk data training ada 140 baris data, dan untuk data testing ada 60 baris data

Model Regresi Sederhana

linier regresi sederhana pada data training

```
lm.r <- lm(sales ~ facebook,
           data = trainingset)
summary(lm.r)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = sales ~ facebook, data = trainingset)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -18.798  -2.300   1.005   3.380   9.880
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  10.91201    0.74771  14.594 < 2e-16 ***
## facebook     0.20636    0.02294   8.995 1.64e-15 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 4.985 on 138 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.3696, Adjusted R-squared:  0.365
## F-statistic: 80.91 on 1 and 138 DF, p-value: 1.643e-15
```

Berdasarkan output diatas bisa dijelaskan bahwa: Persamaan regresi linernya adalah $sales = 11.41 + 0.192 * facebook$

Misal facebook = 3500

```
sales = 10.85 + 0.216*3500
sales
```

```
## [1] 766.85
```

Kalau kita lihat dari model diatas bahwa facebook punya hubungan signifikan terhadap penjualan, artinya nilai penjualan dapat ditingkatkan dari anggaran iklan pada facebook.

Prediksi model regresi dengan data testing


```
yprediksi <- predict(lm.r, newdata = testingset)
head(yprediksi)
```

```
##          1          3          5          8         12         13
## 20.27240 22.27820 13.58641 15.76555 16.85512 19.60380
```

Visualasi hasil data training


```
ggplot() + geom_point(aes(x = trainingset$facebook,
                           y = trainingset$sales), colour = 'red') +
  geom_line(aes(x = trainingset$facebook,
                 y = predict(lm.r, newdata = trainingset)), colour = 'blue') +
  ggtitle('Pengaruh Facebook terhadap Sales (Data Training)') +
  xlab('facebook') +
  ylab('sales')
```

Pengaruh Facebook terhadap Sales (Data Training)



Visualisasi hasil data testing

```
ggplot() + geom_point(aes(x = testingset$facebook,  
                           y = testingset$sales), colour = 'red') +  
  geom_line(aes(x = testingset$facebook,  
                y = predict(lm.r, newdata = testingset)), colour = 'blue') +  
  ggtitle('Pengaruh Facebook terhadap Sales (Data Testing)') +  
  xlab('Facebook') +  
  ylab('Sales')
```



Evaluasi

Sum of Squared Errors (SSE) adalah metrik evaluasi yang mengukur jumlah kuadrat dari selisih antara nilai prediksi dari model regresi dan nilai aktual dalam data. SSE dapat memberikan gambaran tentang seberapa baik model sesuai dengan data.

Dalam konteks regresi linear sederhana, SSE dihitung dengan menjumlahkan kuadrat dari selisih antara nilai prediksi \hat{Y}_i dan nilai aktual Y_i untuk setiap observasi:

$$SSE = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2$$

Dalam R, Anda dapat mengakses SSE langsung dari objek model regresi menggunakan fungsi `sum(model$residuals^2)`. Semakin kecil nilai SSE, semakin baik modelnya, karena SSE mencerminkan seberapa baik model dapat memperkirakan nilai aktual dalam dataset. Namun, penggunaan SSE

sebaiknya selalu dikombinasikan dengan metrik evaluasi lainnya, seperti R-squared, MSE, atau uji lainnya, untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang kinerja model.

```
# Menghitung SSE
sse <- sum(lm.r$residuals^2)
cat("Sum of Squared Errors (SSE):", sse, "\n")
```

```
## Sum of Squared Errors (SSE): 3429.403
```

R-Squared, Nilai R-squared mengindikasikan seberapa besar variasi dalam variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh model. Nilai R-squared berkisar antara 0 (model tidak menjelaskan variasi sama sekali) hingga 1 (model menjelaskan seluruh variasi). Anda dapat menghitung R-squared (koefisien determinasi) dari model regresi linear sederhana menggunakan fungsi `summary()` pada objek model

```
# Mengitung R-Square
model.summary <- summary(lm.r)
r_squared <- model.summary$r.squared
cat("R-squared:", r_squared, "\n")
```

```
## R-squared: 0.3696041
```

Mean Squared Error (MSE) Menghitung MSE dapat memberikan gambaran tentang seberapa baik model dapat menjelaskan variasi dalam data. Semakin rendah MSE dan semakin tinggi R^2 , semakin baik modelnya.

```
# Menghitung MSE
mse <- mean(lm.r$residuals^2)
cat("Mean Squared Error (MSE):", mse, "\n")
```

```
## Mean Squared Error (MSE): 24.49574
```

Metode evaluasi ini memberikan pandangan holistik tentang kinerja model regresi linear sederhana, dan pemilihan metode yang sesuai tergantung pada kebutuhan spesifik analisis Anda.

Latihan

BUatlah model regresi untuk hubungan variabel `youtube` terhadap variabel `sales`

```
# menghitung korelasi antar variabel
koryoutube <- cor(marketing$youtube, marketing$sales)
koryoutube
```

```
## [1] 0.7822244
```

Nilai korelasi dari kedua variabel adalah 0,78

```
# liner regresi sederhana pada data training
lm.y <- lm(sales ~ youtube,
           data = trainingset)
summary(lm.y)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = sales ~ youtube, data = trainingset)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -10.0414  -2.2836  -0.2177   2.5648   8.7101
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  8.298476   0.666100   12.46  <2e-16 ***
## youtube      0.047895   0.003366   14.23  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 3.997 on 138 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5947, Adjusted R-squared:  0.5918
## F-statistic: 202.5 on 1 and 138 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Berdasarkan output diatas bisa dijelaskan bahwa: Persamaan regresi linernya adalah $sales = 8,74 + 0.045 * youtube$

Misal youtube = 3500


```
sales.y = 8.74 + 0.045*3500
sales.y
```

```
## [1] 166.24
```

Visualasi hasil data training youtube

```
ggplot() + geom_point(aes(x = trainingset$youtube,
                          y = trainingset$sales), colour = 'red') +
  geom_line(aes(x = trainingset$youtube,
                y = predict(lm.y, newdata = trainingset)), colour = 'blue') +
  ggtitle('Pengaruh Youtube terhadap Sales (Data Training)') +
  xlab('youtube') +
  ylab('sales')
```


Pengaruh Youtube terhadap Sales (Data Training)



Prediksi model regresi dengan data testing


```
yprediksi.y <- predict(lm.y, newdata = testingset)
head(yprediksi.y)
```

```
##          1          3          5          8         12         13
## 21.523117  9.287019 18.689676 15.206785 20.638025  9.666344
```

Visualasi hasil data testing

```
ggplot() + geom_point(aes(x = testingset$youtube,
                           y = testingset$sales), colour = 'red') +
  geom_line(aes(x = testingset$youtube,
                 y = predict(lm.y, newdata = testingset)), colour = 'blue') +
  ggtitle('Pengaruh Youtube terhadap Sales (Data Testing)') +
  xlab('Youtube') +
  ylab('Sales')
```

Pengaruh Youtube terhadap Sales (Data Testing)



Latihan ## Evaluasi Lakukan evaluasi dari model yang sudah dibuat dengan menggunakan SSE, MSE dan R-Squared

```
# your code
```

Buatlah model regresi untuk hubungan varibel **newspaper** terhadap variabel **sales**

```
# your code
```