

23 학년도 6월 평가원 2062

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]

23 학년도 6월 평가원 2062

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]

23 8555 6월 20일 2062

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]

$$f(x) = 2x^2 + \dots$$

23 8555 6월 20일 2062

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]

$$f(x) = 2x^2 + \dots$$



23 학년도 6월 평가원 2062

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]

23 학년도 6월 평가원 2062

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]

23 학년도 6월 평가원 2062

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]

극소

23 8월 6일 토요일 2002

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]

해 : $g(x)$ 

23 8555 6월 20일 2062

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]


해설 : $g(x)$  
① $g'(x)$ indicate

23 85555 6월 20일 2062

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]



23 85665 692 2062

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]

注意: $g'(x)$ (-) $\rightarrow$ (+)

23 8월 6일 토요일 2002

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]

해 : $g'(x)$ $(-)$ $\rightarrow$ $(+)$

$$g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$$




5/11 그래프 남기고
나머지 채우기

$$g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$$

$\Downarrow$
 $|f(t)| \approx \frac{1}{\sqrt{t}}$

$$g(x) = \int_{\textcircled{x}}^{\textcircled{x+1}} |f(t)| dt$$




$$g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$$

$|f(t)| \approx$ x 부터 $x+1$ 까지 적음


$g(x) \rightarrow |f(x)| \approx x$ 부터 $x+1$ 까지 적음




$g(x) \rightarrow |f(x)| \approx x^2$ 부터 $x+1$ 까지 적음




$g(x) \rightarrow |f(x)| \approx x$ 부터 $x+1$ 까지 적음




$g(x) \rightarrow |f(x)| \approx x$ 부터 $x+1$ 까지 적분



$g(x) \rightarrow |f(x)| \approx$ x 부터 $x+1$ 까지 적분





②



$$y = 2(x-3)^2 - 5$$

그래프



$g(x) \rightarrow |f(x)| \approx$ x 부터 $x+1$ 까지 적음
 ① indicate



정어 윤리.



(가도 하강 요리에 가능?)

$g(x) \rightarrow |f(x)| \approx x$ 부터 $x+1$ 까지 적음





$$\text{부호} : g'(x) \text{ (-)} \rightarrow \text{(+)}$$

$$g(x) \rightarrow |f(x)| \approx x \text{ 부터 } x+1 \text{ 까지 적분}$$




근소 : 넓이의 순간 변화를 $(-)$ $\rightarrow$ $(+)$

$g(x) \rightarrow |f(x)| \approx x$ 부터 $x+1$ 까지 적분




근소 : 넓이의 순간 변화를 $(-)$ $\rightarrow$ $(+)$

$g(x) \rightarrow |f(x)| \approx x$ 부터 $x+1$ 까지 적분





* 반경쟁은 바뀌고
가운데까지 이동



구소 : 넓이의 순간 변화를 $(-)$ $\rightarrow$ $(+)$

$g(x) \rightarrow |f(x)| \approx x$ 부터 $x+1$ 까지 적분





따라서
바꾸면 0이 됨

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.



$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]



최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.


$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]




최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]




극소 1개




최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]



극소 1개



극소 2개?

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

① $|f(t)| = p(t)$ ②

p 는 소문자

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$|f(x)| = p(x) \quad (1)$$

$$g(x) = \int_x^{x+1} p(t) dt \quad (2)$$

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$|f(x)| = p(x)$$

$$g(x) = \int_x^{x+1} p(t) dt$$

$$= [p(t)]_x^{x+1}$$

대입자

(2)

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$|f(t)| = p(t)$$

$$g(x) = \int_x^{x+1} p(t) dt$$

$$= [p(t)]_x^{x+1}$$

$$= p(x+1) - p(x)$$

① $p(t)$ 아래는 네 리고,

② $t \rightarrow x+1$

③ $p(x)$ 아래는

④ $t \rightarrow x$

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$|f(x)| = p(x)$$

$$g(x) = p(x+1) - p(x)$$



최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$|f(x)| = p(x)$$

$$g'(x) = p(x+1) - p(x)$$

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]

$$|f(t)| = p(t)$$

$$g'(x) = p(x+1) - p(x)$$

대문자 $\rightarrow$ 대문자

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 **극소**이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$|f(t)| = p(t)$$

$$g'(x) = p(x+1) - p(x)$$

$$g'(x) \quad (-) \rightarrow (+)$$

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$|f(t)| = p(t)$$

$$g'(x) = p(x+1) - p(x) < 0$$

$$p(x+1) - p(x) > 0$$


$$g'(x) \text{ (-)} \rightarrow \text{(+)}$$

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$|f(t)| = p(t)$$


$$p(x+1) < p(x)$$

$$p(x+1) > p(x)$$

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]


$$|f(t)| = p(t)$$

$$p(x+1) < p(x)$$



$$p(x+1) > p(x)$$

②



최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.


$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$|f(t)| = p(t)$$

$$p(x+1) < p(x)$$



$$p(x+1) > p(x)$$



최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.


$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$|f(t)| = p(t)$$

$$p(x+1) < p(x)$$



$$p(x+1) > p(x)$$



최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.


$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$|f(t)| = p(t)$$

$$p(x+1) < p(x)$$



$$p(x+1) > p(x)$$



최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.


$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$|f(x)| = p(x)$$

$$p(x+1) < p(x)$$



$$p(x+1) > p(x)$$



최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.


$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$|f(t)| = p(t)$$

$$p(x+1) < p(x)$$



$$p(x+1) > p(x)$$



최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.


$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$|f(t)| = p(t)$$

$$p(x+1) < p(x)$$



$$p(x+1) > p(x)$$



최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.


$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$|f(t)| = p(t)$$

$$p(x+1) < p(x)$$

↑ Indicate

$$p(x+1) > p(x)$$



최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.


$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$|f(t)| = p(t)$$

$$p(x+1) < p(x)$$

① transform

$$p(x+1) > p(x)$$



최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.


$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$|f(t)| = p(t)$$

$$p(x+1) < p(x)$$



$$p(x+1) > p(x)$$




최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$|f(t)| = p(t)$$




최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$|f(t)| = p(t)$$




최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$|f(t)| = p(t)$$




최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$|f(t)| = p(t)$$



최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여


함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$|f(t)| = p(t)$$

이 쌍곡선으로 2개

$$y = p(t)$$




최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$|f(x)| = p(x)$$




최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]

$$|f(x)| = p(x)$$

$$p(x) =$$




최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$|f(x)| = p(x)$$

$$p(x) = \underbrace{(x-3)^2}_{(2)} + \underbrace{k}_{(3)}$$




최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]

$$|f(x)| = p(x)$$

$$p(x) = 2(x-3)^2 + k$$




최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$|f(x)| = p(x)$$

$$p(x) = 2(x-3)^2 + k$$




최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$f(x) = 2(x-3)^2 + k$$




최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]

$$f(x) = 2(x-3)^2 + 1$$




최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$f(x) = 2(x-3)^2 + k$$



최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여


함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]

$$f(x) = 2(x-3)^2 + \frac{1}{2}$$

$$f(1) = -f(2)$$

① $f(1)$
② $f(2)$



최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$p(x) = 2(x-3)^2 + k$$

$$f(1) = -f(2)$$

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]

$$f(x) = 2(x-3)^2 + k$$

$$f(1) = 2(1-3)^2 + k \quad \downarrow \text{0} \quad \text{때문에} \quad \text{if } x \rightarrow 1$$

$$f(1) = -f(2)$$

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$p(x) = 2(x-3)^2 + k$$

$$p(1) = 8 + k$$

$$f(1) = -f(2)$$

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$p(x) = 2(x-3)^2 + k$$

$$p(1) = p + k$$

$$p + k = -f(2)$$

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$p(x) = 2(x-3)^2 + k$$

$$p + k = -f(2)$$

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$p(x) = 2(x-3)^2 + k \quad \text{①}$$

$$p(2) = 2(2-3)^2 + k$$

$$\text{② } x \rightarrow 2$$

$$p + k = -f(2)$$

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$p(x) = 2(x-3)^2 + k$$

$$p(2) = 2 + k$$

$$p + k = -f(2)$$

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$p(x) = 2(x-3)^2 + k$$

$$p(1) = 2 + k$$

$$p + k = -(2 + k)$$

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]

$$p(x) = 2(x-3)^2 + k$$

$$p + k = -(2 + k)$$

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$p(x) = 2(x-3)^2 + k$$


$$k = -5$$

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$p(x) = 2(x-3)^2 - 5$$



최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.


$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$p(x) = 2(x-3)^2 - 5$$

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]



Handwritten solution: $f(0) = 2(0-3)^2 - 5$

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

$$f(0) = 13$$