

| ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ****ГЛИЯТОН**** Раствор оральный (85,715 мг холина альфосцерата в 1 мл) МНН: Холина альфосцерат | АТХ: N07AX02 |
Производитель: АО «Фармак», Украина

| ****Лекарственная форма**** | Прозрачный, от бесцветного до желтоватого цвета раствор с ароматом апельсина |

| --- | --- |

| ****Состав (1 мл)**** | Холина альфосцерат 85,715 мг; метилпарагидроксибензоат (Е218), пропилпарагидроксибензоат (Е216), сахарин натрия, ароматизатор апельсина, ксантановая камедь (Е414), бутилгидроксианизол (Е320), вода очищенная |

| ****Объём флакона**** | 7 мл (~600 мг холина альфосцерата в одном флаконе) |

| ****Срок годности**** | 2 года. Хранить при температуре не выше 30°C |

| ****Отпуск**** | По рецепту |

****Фармакодинамика****

Центральный холиномиметик. Содержит 40,5% метаболически защищённого холина. Механизм: расщепляется на холин (биосинтез ацетилхолина) и глицерофосфат (предшественник фосфолипидов мембраны). Проникает через ГЭБ. Накапливается в мозге (45%), лёгких, печени. Почечная экскреция ~10%.

Улучшает функцию памяти, когнитивные способности, эмоциональное состояние, церебральный кровоток, метаболические процессы в мозге. Способствует восстановлению сознания при ЧМТ.

****Фармакокинетика****

Быстро всасывается (~88% дозы), быстро распределяется в органах и тканях. Проникает через ГЭБ. Почечная экскреция ~10%.

****Показания к применению****

- Психоорганический синдром на фоне инволюционных и дегенеративных процессов в головном мозге
- Последствия цереброваскулярной недостаточности
- Первичные и вторичные когнитивные нарушения у пожилых: нарушение памяти, спутанность, дезориентация, снижение мотивации, инициативности, концентрации внимания
- Нарушения поведения и аффективной сферы у пожилых: эмоциональная лабильность, раздражительность, безразличие, псевдомеланхолия

****Способ применения и дозы****

Внутри до еды, запивая водой. По 1 флакону (7 мл) 2 раза в сутки. Длительность лечения определяет врач индивидуально в зависимости от клинической картины, возраста и переносимости. Применять только взрослым (18+). Эффективность и безопасность для детей до 18 лет не установлена.

****Побочные действия****

Хорошо переносится. В начале лечения: тревога, жажда, бессонница (преходящие, не требуют отмены).

ЖКТ: тошнота (допаминергическая активация), абдоминальная боль. НС: кратковременная спутанность сознания (уменьшить дозу), головная боль. ССС: снижение АД. Иммунная система: реакции гиперчувствительности — покраснение, сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отёк.

****Противопоказания****

- Гиперчувствительность к компонентам
- Беременность и период лактации
- Возраст до 18 лет
- Выраженное психомоторное возбуждение при психотических расстройствах

****Лекарственные взаимодействия****

Клинически значимое взаимодействие не установлено.

****Особые указания****

Тошнота может возникать вследствие допаминергической активации. Содержит метилпарагидроксибензоат (Е218) и пропилпарагидроксибензоат (Е216) – возможны аллергические реакции (замедленные). Не влияет на управление автотранспортом.

****Форма выпуска****

По 7 мл во флаконе. По 5 флаконов в блистере. По 2 блистера с инструкцией в пачке.