

| ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ **ЛИРА** Раствор оральный 100 мг/мл
(флакон 30 мл) МНН: Цитиколин | АТХ: N06BX06 | Производитель: АО «Фармак»,
Украина

| **Лекарственная форма** | Прозрачный, от бесцветного до желтоватого цвета
раствор с ароматом клубники |

| --- |

| **Состав (1 мл)** | Цитиколина натрий 104,5 мг (эквив. цитиколину 100 мг);
метилпарагидроксибензоат Е218, пропилпарагидроксибензоат Е216, калия сорбат,
натрия цитрат, лимонная кислота, сорбит Е420, сахарин натрия, ароматизатор
«Клубника», глицерин, вода очищенная |

| **Объём / содержание** | 30 мл (3000 мг цитиколина). Рабочий диапазон доз: 5–
20 мл = 500–2000 мг/сут |

| **Срок годности** | 2 года. Хранить при температуре ≤25°C, не замораживать |

| **Отпуск** | По рецепту |

****Фармакодинамика****

Цитиколин стимулирует биосинтез структурных фосфолипидов мембраны нейронов (МРС-
данные). Улучшает ионные насосы и рецепторы. Ингибирует фосфолипазы А1, А2, С, D
→ уменьшает свободные радикалы → сохраняет антиоксидантную защиту (глутатион).
Сохраняет нейронный энергетический запас, ингибирует апоптоз, улучшает
холинергическую передачу. Нейропротекторное действие при фокальной ишемии.

Клинически: ускоряет функциональное восстановление при ОНМК (уменьшение
ишемического поражения по нейровизуализации); при ЧМТ – сокращает период
восстановления и интенсивность посттравматического синдрома. Улучшает внимание,
сознание, снижает амнезию, когнитивные нарушения при ишемии мозга.

****Фармакокинетика****

Хорошо абсорбируется при пероральном введении (практически полностью).
Биодоступность пероральная ≈ парентеральной. Метаболизируется в кишечнике и
печени до холина и цитидина. Цитиколин встраивается в клеточные,
цитоплазматические и митохондриальные мембраны. С мочой/калом <3%; с выдыхаемым
СО₂ ~12%.

****Показания к применению****

- Инсульт, острая фаза нарушений мозгового кровообращения и лечение
осложнений/последствий

- Черепно-мозговая травма и её неврологические последствия

- Когнитивные нарушения и нарушения поведения вследствие хронических сосудистых
и дегенеративных мозговых расстройств

****Способ применения и дозы****

Внутрь, независимо от приёма пищи. Для взрослых: 500–2000 мг/сут (5–20 мл),
разделить на 2–3 приёма. Набирать раствор шприцем-дозатором, смешивать с
небольшим количеством воды, промывать дозатор водой после каждого применения.
Минимальный рекомендуемый срок лечения – 45 суток. Пожилым коррекция дозы не
требуется.

****Побочные действия****

Очень редко (<1/10000): НС – сильная головная боль, вертиго, галлюцинации; ССС –
гипертензия, гипотензия, тахикардия; дыхание – одышка; ЖКТ – тошнота, рвота,
диарея; иммунная – аллергические реакции (сыпь, экзантема, крапивница, пурпура,
зуд, ангионевротический отёк, анафилактический шок); общие – озноб.

****Противопоказания****

- Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата
- Повышенный тонус парасимпатической нервной системы

****Лекарственные взаимодействия****

Не применять одновременно с препаратами, содержащими меклофеноксат. Усиливает эффект леводопы.

****Особые указания****

Пациентам с наследственными нарушениями толерантности к фруктозе – не применять (содержит сорбит). Метилпарабен (E218) и пропилпарабен (E216) могут вызывать аллергические реакции (замедленные). Содержит 1,2 ммоль натрия в 5 мл – осторожно при натрий-контролируемой диете.

****Форма выпуска****

По 30 мл во флаконе. По 1 флакону с инструкцией в пачке.