

TERRENOS TECTONOESTRATIGRAFICOS DEL NORTE DE COLOMBIA

El Terreno Sierra Nevada y la sección SE del Terreno Baja Guajira se incluyen dentro del Terreno Chibcha. Se propone el término **“Terreno Kogi”** (“Kogui” en español) para denominar el conjunto que comprende el Terreno Sevilla y las rocas metamórficas de la sección media de los Terrenos Baja Guajira y Cosinas. También se propone agrupar los Terrenos Santa Marta y Ruma en un único terreno, que podría denominarse **“Tairona”**.

En una revisión realizada por **Etayo-Serna et al. (1983)**, los terrenos con basamento oceánico en el norte de Colombia corresponden a **Santa Marta**, en la **Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM)**, y **Ruma**, en **La Guajira Peninsular (LGP)**. **Restrepo y Toussaint (1988)** argumentaron que estos terrenos están asociados con el **Terreno Calima**, mientras que **Gómez et al. (2015a)** sugirieron que están asociados con el **Megaterreno Caribeño**. En este trabajo, ambos se agrupan como un único **Terreno Tairona**, denominado así en honor a una importante cultura precolombina de la SNSM.

En **La Guajira Peninsular (LGP)**, el **Terreno Tairona**, limitado hacia el sureste por la **Falla Simarua-Osorio**, que produjo una intensa **milonitización**, se sobrepone tectónicamente al **Terreno Kogui**. De acuerdo con el **Mapa Geológico de Colombia** (Gómez et al., 2015b), **calizas arrecifales asociadas con margas, lodolitas y areniscas de la Formación Uitpa, de edad Eocena**, cubren este límite. Esto sugiere que la **suturas entre los Terrenos Tairona y Kogui ocurrió entre el Cretácico Tardío y el Paleoceno**.

En la **LGP**, el Terreno Tairona incluye el **Complejo Metamórfico Etpana**, presumiblemente de edad **Cretácica Tardía**, y está intruido por el **Plutón Granodiorítico de Parashi**, cuya edad fue determinada mediante U-Pb en **49 ± 1 Ma** (Cardona et al., 2014).

En el **Complejo Etpana** y en **Cabo de la Vela** se ha señalado la presencia de **serpentinitas con diques de rodingita**. En esta zona también se encuentran **esquistos, anfibolitas y filitas** pertenecientes a las **serranías de Jarara y Carpintero**.

Cardona et al. (2014) plantearon la hipótesis de que durante el **Cretácico** se desarrolló un **arco insular intraoceánico** en una posición alóctona, el cual posteriormente fue acrecionado antes de la intrusión del **Plutón de Parashi** durante el Eoceno.

Piraquive et al. (2017) propusieron que unidades de **afinidad oceánica**, como la **Formación Jarara** del Terreno Tairona, se sobreponen tectónicamente a unidades continentales similares al **Gneis de Macuira**, pertenecientes al Terreno Kogui. Estos autores propusieron que la **acreción ocurrió entre el Cretácico Tardío y el Paleoceno**.

El **Terreno Tairona** presenta ciertas similitudes con los **Terrenos Calima y Tumaco**. Todos ellos poseen **basamentos oceánicos de edad Cretácica**; sin embargo, hasta que se disponga de mayor información, parece más apropiado considerarlos como **terrenos tectónicos diferentes**.

El Terreno Chibcha está constituido principalmente por un basamento metamórfico de Grenville, principalmente de edad Esteniense–Toniense, y por un evento metamórfico Famatiniano (Caledoniano) de bajo a medio grado. El magmatismo de composición intermedia a ácida anterior al Devónico afectó principalmente al Macizo de Santander, seguido por una importante sedimentación marina del Paleozoico tardío que tuvo lugar en todo el Terreno Chibcha. Su acreción al Cratón Amazónico y al Terreno Andaquí pudo haber ocurrido durante el Paleozoico tardío.

En la LGP, la región SE del Terreno Baja Guajira es similar al Terreno Chibcha de la SNSM, con el Gneis de Jojoncito, cuya edad fue determinada mediante U–Pb en 916 ± 19 Ma (Cordani et al., 2005).

En la LGP, el límite entre los Terrenos Kogui y Chibcha está marcado por un conjunto de imbricaciones tectónicas con escamas cretácicas de rocas sedimentarias, como las de la Formación Poschachi, lo que sugiere movimientos posteriores a lo largo del límite entre estos terrenos.

En la LGP, el Terreno Tairona está limitado hacia el SE por la Falla Simarua–Osorio, que presenta una fuerte milonitización y cabalga sobre el Terreno Kogui. Las calizas arrecifales eocenas asociadas con margas, lutitas y areniscas de la Formación Uitpa cubren este límite, lo que indica que la unión entre los Terrenos Tairona y Kogui ocurrió durante el Cretácico tardío–Paleoceno.