

解剖生理学 I リンパ・免疫part3 赤シート一問一答

出典:解剖生理(リンパ_免疫 part3).pdf(スライド23枚) 全20問

使い方: **赤い文字**(答えと見出し)を赤シートで隠して答える。正解したら右の口に✓(3回分)。

スライドの太字・学習ポイント・先生が「重要」と書いた箇所から作成。★=太字、または先生が「重要」と明記(最優先で覚える)

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
自己免疫疾患			
1	①本来の免疫が、自己の構成成分には働かないこと ②このシステムがおかしくなり、自分の体を構成している物質を異物と認識して攻撃してしまうために発症する疾患	① 免疫寛容 ② 自己免疫疾患	☐ ☐ ☐
2	No.1②のうち、次の疾患は何に対する抗体によるものか ①関節リウマチ ②橋本病 ③バセドウ病(その作用も) ④自己免疫性溶血性貧血 ※②③は一般的な教科書と表現が異なる。試験はスライドどおり	① 関節の滑膜 ② 甲状腺ホルモン ③ 甲状腺細胞(TSH様作用) ④ 赤血球	☐ ☐ ☐ ☐
3	No.1②のうち、次の疾患で侵される(破壊される)もの ①重症筋無力症(抗体が結合する部位と、その結果) ②1型糖尿病 ③多発性硬化症 ④全身性エリテマトーデス(SLE) ⑤糸球体腎炎	① 神経筋接合部 (結果: 神経から筋への刺激伝達が阻害される) ② 膵臓のインスリン産生細胞 ③ 中枢神経の髄鞘 ④ 腎臓・心臓・肺・皮膚 ⑤ 腎臓の糸球体	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	No.1②の ①発症率が高いのは男性と女性のどちらか ②治療に使われる薬(その作用も)	① 女性 ② 副腎皮質ステロイドホルモン(免疫抑制作用)	☐ ☐ ☐
アレルギー反応			
5	①アレルギーとは ②アレルギー反応の種類の数	① 身体に無害の抗原を免疫系が脅威として認識してしまった結果、かえって自分の組織を傷害してしまう過剰な免疫応答 ② I型~IV型の4種類	☐ ☐ ☐
6	各型のアレルギーの別名 ①I型(2つ) ②II型 ③III型 ④IV型(2つ)	① 即時型・アナフィラキシー型 ② 抗体依存性細胞障害型 ③ 免疫複合体性 ④ 遅延型・細胞媒介性	☐ ☐ ☐ ☐
7	I型アレルギーの発生機序 抗原(アレルゲン)が体内に入ると、Bリンパ球から分化した(①)が抗体(特に②)を産生 → ②は(③)や、白血球の一種である(④)の表面に結合 → 同じアレルゲンが再び入ると、③表面の②と結合 → ③から大量の(⑤)が分泌される ⑥③が存在する組織(2つ)	① 形質細胞 ② IgE ③ 肥満細胞(マスト細胞) ④ 好塩基球 ⑤ ヒスタミン ⑥ 結合組織・粘膜下組織	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	No.7⑤の物質の作用 ①血管への作用(その結果も) ②分泌への作用 ③気道への作用 ④その結果生じる症状(4つ)	① 血管が拡張し、透過性が亢進する → 浮腫 ② 大量の粘液が分泌される ③ 平滑筋を収縮させ、気道狭窄を起こす ④ 鼻水・流涙・かゆみ・蕁麻疹	☐ ☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
9	①呼吸困難を伴わない軽症のⅠ型アレルギーの治療薬 ②Ⅰ型アレルギーが全身性に引き起こされたもの ③②を誘発するもの(スライドの例) ④②で死亡の恐れがある理由 ⑤②の治療で投与する薬	①抗ヒスタミン薬 ②アナフィラキシーショック ③蜂や蜘蛛の毒・ある種 of 食物 ④呼吸困難や循環不全を一気に起こすから ⑤アドレナリン(エピネフリン、エピペン)	☐ ☐ ☐
10	Ⅱ型アレルギー ①何に対する抗体で引き起こされるか ②細胞が破壊されるしくみ(2つ) ③例のうち、輸血によるものと、神経・筋の疾患(それぞれ原因となる抗体も)	①体内の血液細胞や組織細胞上にある抗原 ②自己抗体が補体と共にその細胞を破壊する・マクロファージが自己細胞を貪食して分解する ③血液型不適合輸血(抗A・抗B抗体)・重症筋無力症(アセチルコリン受容体に対する抗体)	☐ ☐ ☐
11	Ⅲ型アレルギー ①関係するもの(3つ) ②機序(抗原は何?何が形成される?) ③②以外に組織を傷害するしくみ(呼び寄せる細胞と、放出させる物質) ※③の物質名は、一般的な教科書と表現が異なることがある。試験はスライドどおり	①抗原・抗体・補体 ②血液など体液に溶けている蛋白質を抗原とする抗体が出現し、抗原と抗体の免疫複合体が形成され、補体とともに組織を傷害する ③好中球を呼び寄せてリゾチームを放出させ、組織を傷害する	☐ ☐ ☐
12	Ⅳ型アレルギー ①関係する細胞(3つ) ②液性免疫と細胞性免疫のどちらが深く関係する? ③機序 ④反応が惹起されるまでに要する時間(Ⅳ型の別名の1つの由来)	①マクロファージ・ヘルパーT細胞・キラーT細胞 ②細胞性免疫 ③抗原提示を受けたヘルパーT細胞が、細胞障害性T細胞や好中球を活性化して自己細胞を攻撃させる ④1日~2日	☐ ☐ ☐
13	次の疾患は何型のアレルギーか(スライドのまとめ) ①気管支喘息・花粉症・食物アレルギー ②自己免疫性溶血性貧血 ③糸球体腎炎・関節リウマチ ④接触性皮膚炎・ツベルクリン反応	①Ⅰ型 ②Ⅱ型 ③Ⅲ型 ④Ⅳ型	☐ ☐ ☐
14	ツベルクリン反応 ①ツベルクリンとは ②結核に罹ったことがある人で強い反応(皮膚が赤く腫れ上がる)が起こる理由	①結核菌の精製蛋白質 ②メモリーT細胞があるため	☐ ☐ ☐
AIDS(後天性免疫不全症候群)			
15	①AIDSの日本語の正式名称 ②AIDSを引き起こすウイルス(HIV)の日本語名	①後天性免疫不全症候群 ②ヒト免疫不全ウイルス	☐ ☐ ☐
16	HIVの ①感染源となる体液(3つ) ②感染経路(3つ) ③出産時の出血により新生児に感染すること(感染が起こる場所を表す名称)	①精液・頸管分泌液・血液 ②膣ないし肛門性交・汚染された注射針(麻薬の回し打ち)・母親から子供へ(垂直感染) ③産道感染	☐ ☐ ☐
17	①HIVが体内に侵入して感染・破壊する細胞 ②その結果どうなる?	①ヘルパーT細胞 ②細胞性免疫と液性免疫の両方が働かなくなる	☐ ☐ ☐
18	①免疫が働かず、普段はすぐに退治できる弱い病原菌やカビを排除できなくなって起こる感染 ②免疫による監視機構が働かず、増殖しやすくなるもの	①日和見感染(ひよりみかんせん) ②がん細胞(発癌)	☐ ☐ ☐
19	HIV感染症の経過 初期は(①)→一旦軽快した後(②)→ある時(③)→慢性の下痢・発熱・体重減少・貧血などが現れAIDSを発症→末期には、カビの一種による(④)を発症したり、皮膚癌の一種である(⑤)をはじめとする悪性腫瘍が発生 ※②の期間は教科書によって記載が異なるが、試験はスライドどおり	①普通の風邪のような症状 ②2年以上の無症状期 ③全身のリンパ節が腫れる ④ニューモシスチス肺炎 ⑤カポジ肉腫	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
20	①HIVに感染してもAIDSを発症しない患者が増えている理由 ②適切な治療を続けて体内のウイルス量が検出限界未満なら、性交渉で感染させるリスクはないという概念 ③②でもコンドームの使用が推奨される理由	①様々な抗ウイルス薬によって、体内でのHIV増殖を抑制できるようになったから ②U=U (Undetectable=Untransmittable) ③他の性感染症のリスクは残るから	☐ ☐ ☐