

解剖生理学Ⅱ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド33枚) 全79問
使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。
番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

13.皮膚	33枚	79問
-------	-----	-----

13 皮膚

出典:解剖生理(皮膚).pdf(スライド33枚) 全79問

人体の膜

- 人体の膜は、上皮性の膜である ①・②・
1 ③と、結合組織の膜である ④に分けられ
★ る。

- 外界と交通する中空器官の内腔を覆う上皮性の膜
2 を①という。①は、②と、その下の
★★ ③(④)からなる。


重要

- ① 皮膚
ねんまく
② 粘膜
しやうまく
③ 漿膜
かつまく
④ 滑膜

皮膚は表皮と真皮、粘膜は粘膜上皮と粘膜固有層、漿膜は胸膜・腹膜・心膜からなる。結合組織の膜である滑膜は関節にある(スライド2)。それぞれ、この後の問題でくわしく学ぶ。

- ① 粘膜
② 粘膜上皮
③ 粘膜固有層
そせいけつごうそしき
④ 疎性結合組織

全ての粘膜上皮の下には、粘膜固有層と呼ばれる疎性結合組織が広がっている。図の右下「消化管壁の例」で、粘膜上皮と粘膜固有層の位置を確認しよう。図の左は、からだの各所の粘膜。




スライド4の図

□□□ No.2④には ① が多くあり、② の貯水池と
3 して働く。
★★

かんげき
① 間隙

② 水分や塩類

まとめ: 疎性結合組織には間隙が多くあり、水分や塩類の貯水池として働く(スライドでは「間隙が多くあり」が太字)。



スライド5の図

□□□ No.2①は ① および ② の機能をもち、表面
4 は ③ である。
★

① 分泌

② 吸収
しつじゅん

③ 湿潤

まとめ: 表面は湿潤である。皮膚の表面が乾燥している(No.17)のと対照的。

□□□ 外界と交通しない ① の表面を覆う上皮性の膜
5 を ② といい、③ と疎性結合組織からでき
★★ ている。

たいくう
① 体腔

② 漿膜

たんそうへんぺいじょうひ
③ 単層扁平上皮

外界と交通する所を覆う粘膜(No.2)とは逆に、漿膜は外界と交通しない所を覆う。スライドでは「体腔の表面」が太字、単層扁平上皮が青字。

□□□ No.5②は、① ・ ② ・ ③ からなる。
6
★

ふくまく
① 腹膜

きょうまく
② 胸膜


しんまく
③ 心膜

スライドでは、3つとも青字・太字。

□□□ No.5②のうち、臓器の表面を覆う部分を 、
7 の内面を覆う部分を という。
★★★

- ぞうそくしょうまく
① 臓側漿膜
たいくう
② 体腔
へきそくしょうまく
③ 壁側漿膜

まとめ: 臓側漿膜は臓器の表面、壁側漿膜は体腔の内面を覆う。図では、腹膜を例に壁側腹膜と臓側腹膜が示されている。



スライド6の図

□□□ No.5②は を分泌して、 を防ぐ。
8
★


- しょうえき
① 漿液
まさつ
② 摩擦

まとめ: 漿液を分泌（摩擦を防ぐ）。次の問題の滑膜が分泌する滑液と区別しよう。

□□□ 関節を包む線維性被膜を といい、 を
9 分泌し、 を吸収する。
★

- かつまく
① 滑膜
かつえき
② 滑液
しょうげき
③ 衝撃

まとめ: 滑液を分泌、衝撃を吸収する。人体の膜のうち、結合組織の膜はこの滑膜(スライド2)。図で、関節腔・関節軟骨と滑膜の位置を確認しよう。



スライド7の図

外皮と外皮系の機能

□□□ 皮膚と ① を合わせて ② という。

10

★

- ① ^{ふぞくき}付属器
② ^{がいひ}外皮

付属器として、**脂腺・汗腺**(スライド13～16)と、**毛・爪**(スライド17・18)を学ぶ。

□□□ No.10②の機能は4つあり、人体の ① の保護、
11 ②、汗による排泄、皮膚内での合成である。

★★

- ① **深部組織**
② **体温調節**

まとめ:人体の**深部組織を保護**／**体温調節**／汗による排泄・皮膚内での合成(No.15)。保護のしくみは次の問題から。

□□□ 外皮系による保護では、① に対しては ②
12 がクッションとなり、③ に対しては表皮と
★★ ④ の分泌物(汗)が守っている。

- ① **物理的圧力**
② **脂肪組織**
③ **細菌感染**
④ **酸性**

まとめ:**物理的圧力**→**脂肪組織がクッション**、**細菌感染**→**表皮と酸性の分泌物(汗)**。スライドでは**脂肪組織と酸性**が青字・太字。汗が**酸性**であることは、エクリン汗腺の汗(No.32)でも学ぶ。

□□□ 外皮系による保護では、① に対しては ②
13 (表皮で産生される色素)が守っている。
★

- ① **紫外線**
② **メラニン色素**

メラニン色素は、**表皮のメラノサイト**が産生する(No.20)。

□□□ 外皮系が守る相手は6つあり、No.12・No.13で挙げた3つのほかは、①・②・③である。
14
★★★

- ① **化学物質**
② **温熱・寒冷**
③ **乾燥**

まとめ:守る相手は**物理的圧力・化学物質・細菌感染・紫外線・温熱・寒冷・乾燥**の6つ(スライドではどれも赤字)。

□□□ 外皮系の機能のうち、汗によって ①・② が
15 排泄され、皮膚内の ③ からは ④ が合成される。
★★

重要

- ① ^{にようそ}**尿素**
② ^{にようさん}**尿酸**
③ **コレステロール**
④ **VitD(ビタミンD)**

まとめ:**尿素・尿酸の排泄(汗による)**／**VitD(ビタミンD)の合成(皮膚内のコレステロールから)**。スライドでは**尿素・尿酸・VitD**が赤字・太字。


皮膚の構造

- 皮膚は ① と ② の2種類の組織からなる。
 16 表層の ① は ③、その下の ② は
 ★★★ ④ でできている。

重要

- ひょうひ
 ① 表皮
 しんぴ
 ② 真皮
 かくかじゅうそうへんべいじょうひ
 ③ 角化重層扁平上皮
 ちみつけつごうそしき
 ④ 緻密結合組織

図で、表皮・真皮・皮下組織の位置を確認しよう。表皮にはケラチノサイトとメラノサイトがある。



スライド10の図

- No.16②の下には、① に富む ② があり、
 17 ③ でできている。皮膚の表面は ④ してい
 ★★ る。

重要

- ① 脂肪組織
 ② 皮下組織
 そせいけつごうそしき
 ③ 疎性結合組織
 かんそう
 ④ 乾燥

まとめ: 真皮の下に脂肪組織に富む皮下組織がある。皮膚の表面が乾燥しているのは、粘膜の表面が湿潤である(No.4)のと対照的。



スライド3の図

- 表皮には ① がない。表皮細胞のほとんどは
 18 ② (③) からなり、表皮は ④ でそっく
 ★★ り入れ替わる。

- ① 血管
 ② ケラチノサイト
 ③ 角化細胞
 ④ 約1ヶ月

まとめ: 表皮には血管がない。表皮には、ほかにメラニン色素を産生するメラノサイトがある(No.20)。

□□□ 真皮は、人体を包む丈夫で ① に富んだ膜である。
19 ② や ③ で厚く、④ で薄い。
★★

- ① 伸縮性
しゆしよく
② 手掌
そくてい
③ 足底
がんけん
④ 眼瞼

まとめ: 真皮は 人体を包む丈夫で伸縮性に富んだ膜で、手掌や足底で厚く、眼瞼で薄い(スライドでは太字・下線)。革製品は動物の真皮である。

皮膚の色の決定因子

□□□ 皮膚の色の決定因子の1つは、紫外線から皮膚を守る ① である。① は、表皮にある ② に
20 よって産生される。
★
重要

- ① メラニン(メラニン色素)
② メラノサイト

メラニン色素は、外皮系の保護でも紫外線から守る働きをしていた(No.13)。

□□□ ① の ② は、人種で差はない。肌の色が異なるのは、③ と ④ による。
21
★★★

- ① メラノサイト
② 数
③ メラニン量
かりゅう
④ メラニン顆粒の大きさ

まとめ: メラノサイトの数は人種で差はない(スライドでは下線)。メラニン量とメラニン顆粒の大きさが肌の色が異なる(スライドでは青字・太字・下線)。

□□□ 皮膚の色は、① の酸素化の程度によっても変わる。① の酸素飽和度が低いと、② になる。
22
★
重要

- ① ヘモグロビン
② チアノーゼ

スライドでは、皮膚の色の決定因子としてメラニン・ヘモグロビン・胆汁色素(ビリルビン)・カロチンの4つがあげられている(どれも赤字・太字)。

□□□ ① (②) も、皮膚の色の決定因子である。
23 血中の ② が上昇すると ③ になる。
★★
重要

- たんじゅうしきそ
① 胆汁色素
② ビリルビン
おうだん
③ 黄疸

まとめ: 血中ビリルビン上昇による黄疸。

□□□ 皮膚の色の決定因子は4つあり、No.20①、
24 No.22①、No.23①のほかに ① がある。
★★
重要

- ① カロチン
② 皮下組織


まとめ: 皮下組織のカロチン。

脂腺・汗腺

- 皮膚の外分泌腺には ① と ② があり、どちらも ③ に形成されている。
★

- ① ^{しせん}脂腺
② ^{かんせん}汗腺
③ 真皮の深層

図で、脂腺と汗腺の位置を確認しよう。



スライド14の図

- No.25②には、① と ② の2種類がある。
26
★
重要

- ① エクリン汗腺
② アポクリン汗腺

図で、2種類の汗腺の違いを確認しよう(くわしくはNo.30～No.34)。



スライド16の図

- 脂腺は、① と ② を除く皮膚の全域に分布し、腺管は ③ ないしは皮膚表面に開口する。また、④ の作用で活発化する。
27
★★

- ① ^{しゅしょう}手掌
② ^{そくてい}足底
③ ^{もうほう}毛包
④ 男性ホルモン

まとめ: 手掌と足底を除く皮膚の全域に分布(スライドでは太字・下線)、毛包ないしは皮膚表面に開口。

- 脂腺は ① (② と ③) を分泌する。
28
★★

- ① ^{ひし}皮脂
② 脂質
③ ^{さんがい}細胞の残骸

脂腺の腺管が皮脂でつまり、さらに炎症を伴ったものが尋常性ざ瘡(No.49)。

□□ 脂腺には、皮膚の ① と ② がある。

29

★★

① じゅんかつさう 潤滑作用

② 殺菌作用

スライドでは潤滑作用・殺菌作用が青字。エクリン汗腺の汗にも殺菌作用がある(No.32)。

□□ エクリン汗腺は ① から汗を分泌し、② に働く。この汗腺は ③ の支配を受ける。

30

★★

① かんこう 汗孔

② 体温調節

③ 交感神経

まとめ: 汗孔から分泌、体温調節(交感神経支配)。体温調節は外皮系の機能の1つ(No.11)。

□□ エクリン汗腺の汗には、①、②、③が含まれる。

31

★★

① NaCl

② 代謝産物

③ 乳酸

代謝産物は、具体的には尿素・尿酸。尿素・尿酸の排泄は、外皮系の機能の1つ(No.15)。

□□ エクリン汗腺の汗は ① (②) で、③ がある。

32

★★★

① 酸性

② pH4~6

③ 殺菌作用

まとめ: 酸性(pH4~6)→殺菌作用。汗が酸性であることは、細菌感染からの保護にも役立つ(No.12)。

□□ アポクリン汗腺は ① に分布し、② に開口する。分泌物は ③ を含み、④ によって臭う。

33

★★★

① えきか えいんぶ 腋窩や会陰部

② もうほう 毛包

③ 脂肪酸や蛋白質

④ 細菌

エクリン汗腺が汗孔から汗を分泌するのに対し、アポクリン汗腺は毛包に開口する。まとめ: 細菌によって臭う。

□□ アポクリン汗腺は ① で活発化し、② ・ ③ ・ ④ で活動が亢進する。

34

★★

① 男性ホルモン

② 疼痛

③ ストレス

④ 性交渉


男性ホルモンで活発化するのは、脂腺も同じ(No.27)。

毛と爪

- 毛は上皮に由来する構造物で、①の部分で形
 35 成される。毛は、①に包まれた②の部分
 ★★ と、皮膚の外に出ている③の部分からなる。

- もうほう
 ① 毛包
 ② 毛根
 もうこん
 ③ 毛幹
 もうかん

図で、毛包・毛根・毛幹の位置を確認しよう。図の右上は毛を拡大したもので、最表面がキューティクル、その内側に毛皮質・毛髄質がある。



スライド17の図

- 成人の①・②・③の成長は、
 36 ④の影響を受ける。
 ★

- とうもう
 ① 頭毛
 ちもう
 ② 恥毛
 えきもう
 ③ 腋毛
 ④ ホルモン

スライドでは「ホルモンの影響」が太字。脂腺・アポクリン汗腺も男性ホルモンで活発化する(No.27・No.34)ので、あわせて覚えよう。

- 毛の最表面にある①(②)は、屋根瓦のよう
 37 うに重なり合った一層の細胞層からなり、③の
 ★★ を防いでいる。

- ① キューティクル
 もうしょうひ
 ② 毛小皮
 ③ 毛が絡み合う

まとめ: 毛が絡み合うのを防ぐ。No.35の図の右上で、毛の最表面のキューティクルを確認しよう。

- No.37②が損傷を受けると、毛内部の①がほ
 38 つれて②になる。
 ★★

- ① ケラチン線維
 えだげ
 ② 枝毛

スライドではケラチン線維が青字。

- 毛包では、①とよばれる②が真皮に付着
 39 している。
 ★

- りつもうきん
 ① 立毛筋
 ② 平滑筋

No.35の図で、立毛筋の位置を確認しよう。

□□□ 寒さや恐怖で ① が興奮してNo.39①が収縮すると、毛が立って ② が少し隆起し、 ③ になる。
★★

① 交感神経

② 毛穴の周囲

③ 鳥肌
とりはだ


まとめ: 毛が立って毛穴の周囲が少し隆起する=鳥肌(スライドでは交感神経・鳥肌が青字・太字)。

□□□ 爪は上皮が鱗状^{りんじょう}に変化したもので、角化した
41 ① 板からなる。爪は ② で細胞が増殖し、
★★ 死んだ細胞がかたい ① に変化して、押し出されることによって作られる。

① ケラチン

② 爪母基(そうぼき)

図で、爪母基・爪床・爪半月の位置を確認しよう。



スライド18の図

□□□ 爪の裏には ① があり、 ② を作っている。
42
★★★

① 表皮の基底層

② 爪床(そうしょう)

基底層は、表皮の一番深い所にある層(No.66)。

□□□ 爪の大部分は、下を通っている ① のためピンク色をしているが、 ② の部分は白っぽく見える。これは上皮が十分に ③ していないからで、
★★★ ④ とは関係無い。

① 毛細血管

② 爪半月(つめはんげつ)

③ 角化

④ 健康状態

まとめ: 上皮が十分に角化していないので白っぽく見える(健康状態とは関係無い)。No.41 の図の右側(爪を上から見た図)で、爪半月の位置を確認しよう。


皮膚の疾患(炎症)

- ① は ② の感染によって起こる皮膚炎で、
 44 ③ に掻痒・発赤・表皮剥離を伴う。
 ★★

- あしはくせん
 ① 足白癬
 しんきん
 ② 真菌
 そくしかん
 ③ 足趾間

まとめ: 真菌感染。スライドでは「足趾間」が太字。写真は上から足白癬・単純ヘルペス・膿痂疹。

- ・ 足白癬
 真菌感染
 足趾間に掻痒・発赤・表皮剥離を伴う
- ・ 単純ヘルペス
 単純ヘルペスウイルスの感染
 疼痛・掻痒を伴う水疱を伴う
 口唇・口腔粘膜に見られる
- ・ 膿痂疹(とびひ)
 連鎖球菌の感染。学童期に多い
 口や鼻の周囲に多く見られ、発赤を伴う小水疱
 破れると黄色の痂皮(かさぶた)を形成する



スライド21の写真

- ① は ② の感染によって起こる皮膚炎で、
 45 疼痛・掻痒を伴う ③ ができる(No.44の写真の
 ★ 中段)。

- ① 単純ヘルペス
 ② 単純ヘルペスウイルス
 すいほう
 ③ 水疱

スライドでは水疱が太字。

- No.45①は、①・②に見られる。
 46
 ★★

- こうしん
 ① 口唇
 こうくうねんまく
 ② 口腔粘膜

スライドでは口唇・口腔粘膜が太字。

- ① (②) は、③ の感染によって起こる
 47 皮膚炎で、④ に多い(No.44の写真の下段)。
 ★★

- のうかしん
 ① 膿痂疹
 とびひ
 れんさきゅうきん
 ② とびひ
 ③ 連鎖球菌
 ④ 学童期

まとめ: 連鎖球菌の感染。スライドでは「学童期」が太字。

- No.47①は ① の周囲に多く見られ、② を
 48 伴う ③ ができる。これが破れると、黄色の痂皮
 ★★★ (かさぶた)を形成する。


- ① 口や鼻
 ほっせき
 ② 発赤
 しょうすいほう
 ③ 小水疱

まとめ: 口や鼻の周囲に発赤を伴う小水疱。※スライドでは「小水疱」と書かれているが、皮膚の水ぶくれは「小水疱」と書く。

□□□ ① (②) は、いわゆる「 ③ 」のことで
49 ある。
★

- ① ^{じんじょうせいざそう}尋常性ざ瘡
② Acne
③ にきび

写真は尋常性ざ瘡の例。



スライド22の写真

□□□ No.49①では、① の腺管が皮脂でつまり、さら
50 に ① に ② ^{はんこん}を伴う。瘢痕を残すこともある。
★

- ① ^{しせん}脂腺
② 炎症

脂腺は皮脂を分泌する(No.28)。脂腺の炎症を伴うのがポイント(スライドでは「炎症」が太字)。

熱傷

□□□ 皮膚の蛋白質が変性したり、細胞が死んだ状態を
51 ① といい、その面積を推定する方法として
★ ② がある。

- ① ^{ねっしょう}熱傷
② 9の法則

「9の法則」の中身は No.54 で学ぶ。

□□□ No.51①から生じる問題点の1つは ① で、
52 ① → ② → ③ となる。
★★★

- ① 体液の損失
② 水・電解質の異常
③ ショック状態

まとめ: 体液の損失→水・電解質の異常→ショック状態(スライドでは体液の損失が青字)。

□□□ No.51①から生じるもう1つの問題点は ① で、
53 ② 起こる。
★★


- ① 感染症
② 受傷数日後

まとめ: 感染症(受傷数日後)。

□□□ No.51②では、全身に占める割合を、顔面・頭部・頸
 54 部が ①、上肢(左右あわせて)が ②、体幹
 ★★★ (前面と後面をあわせて)が ③、会陰部が
 ④、下肢(左右あわせて)が ⑤とする。

- ① 9%
 ② 18%
 ③ 36%
 ④ 1%
 ⑤ 36%

図のとおり、**体幹前面は18%**。合計すると $9+18+36+1+36=100\%$ になる。



スライド24の図

□□□ 熱傷はI～III度に分類される。I度は ①、II度は
 55 ②、III度は ③である。
 ★★

- ① 表皮の損傷
 ② 表皮と真皮の損傷
 ③ 皮膚全層の損傷

No.16 の図で、**表皮・真皮**の位置を確認しよう(スライドでも、この分類の直前に皮膚の構造の図が再び示されている)。



スライド26の写真

□□ Ⅰ度熱傷では、表面から ① と ② が観察さ
56 れ、代表例は ③ (④)である。
★★

- ① 発赤
ほっせき
② 腫脹
しゅちよう
③ 日焼け
④ サンバーン

スライドでは日焼け(サンバーン)が赤字。No.55 の写真(上段)で、Ⅰ度のようすを確認しよう。

□□ Ⅱ度熱傷では、No.56①・②に加えて ① が見ら
57 れ、局所には残存した ② がある。
★★

- ① 水疱
すいほう
② 表皮組織

まとめ:Ⅱ度では水疱(形成)が見られ、局所には残存した表皮組織がある。No.55 の写真(中段)で確認しよう。

□□ Ⅲ度熱傷では、局所は ① (②)となる。
58
★★★

- ① 灰白色～黒色
かいはいしよく
② 羊の皮様

スライドでは羊の皮様が青字。No.55 の写真(下段)で確認しよう。

□□ Ⅲ度熱傷では、① も破壊されるので ② が
59 無い。また、③ はなく、④ が必要である。
★★★

- ① 感覚受容器
② 痛覚
③ 上皮組織
しよくひじゅつ
④ 植皮術

まとめ:痛覚が無い(スライドでは太字・下線)のは、感覚受容器も破壊されるから。上皮組織はなく、植皮術が必要。

□□ 重症熱傷の基準は3つある。そのうち2つは、Ⅱ度の熱
60 傷が全身の ① 以上、Ⅲ度の熱傷が全身の
★★★ ② 以上であることである。

- ① 25%
② 10%

まとめ:Ⅱ度の熱傷が全身の25%以上／Ⅲ度の熱傷が全身の10%以上。

□□ 重症熱傷の基準の3つ目は、① ・ ② ・
61 ③ のⅢ度の熱傷である。
★

- ① 顔面
② 手
③ 足

まとめ:顔面・手・足のⅢ度の熱傷。

□□ No.61①～③のうち、頭部にある部位の熱傷では
62 ① を合併していることが多く、② による窒
★★★ 息を起こすので注意する。また、四肢の関節部位の熱
傷では、③ による④ の障害を引き起こす。

- ① 気道熱傷
きどうねっしょう
② 喉頭浮腫
こうとうふしゅ
③ 瘢痕形成
はんこんけいせい
④ 関節運動

まとめ:顔面の熱傷では気道熱傷を合併していることが多い→喉頭浮腫による窒息。手足の関節部位の熱傷→瘢痕形成による関節運動の障害(スライドでは青字・太字・下線)。

褥瘡

- 自分の意思で寝返りや体位変換ができない患者に
 63 みられる皮膚の障害を ① という。体重により
 ★★ ② が圧迫されて、③ を引き起こす。

- ① 褥瘡(じょくそう)
 ② 骨に近い皮膚
 ③ 血流障害

まとめ:体重により**骨に近い皮膚**が圧迫され**血流障害**を引き起こす(スライドではどちらも太字)。写真は**褥瘡**の例。



スライド29の写真

- No.63③の結果、皮膚の ① や ② を生じる。
 64
 ★


- ① 壊死
 ② 潰瘍

スライドでは**壊死・潰瘍**が太字。

- No.63①がしやすい部位として、図では、^{ぎょうがい}仰臥位(仰向き)では ① (お尻の上部の中央)や
 65 ② (かかと)、横臥位(横向き)では ③ (太
 ★★ ももの付け根の外側)などが示されている。

- ① 仙骨部
 ② 踵部
 ③ 大転子部

図の赤色の部分が、人間の体のなかで圧迫を受けやすく**褥瘡**のしやすいところ(どれも**骨に近い皮膚**)。ほかに、仰臥位では肩甲骨部・肘関節部、横臥位では耳介部・肩鎖関節部などが示されている(スライドの図には、^{ふくがい}腹臥位(うつ伏せ)と坐位の例もある)。



スライド29の図(左半分)

表皮の構造と皮膚癌


□□□ 表皮の一番深い所にある層を ① といい、その上
66 に ② がある。

★

重要

- きていそう
① 基底層
ゆうきよくそう
② 有棘層

図で、基底層と有棘層の位置を確認しよう。



スライド31の図

□□□ No.66①は ① と接している。No.66①では、さ
67 かに細胞が ② して、③ に向けて細胞を
★ 押し上げている。

- ① 真皮
② 分裂
③ 表皮の表面

まとめ: 表皮の一番深い所は真皮に近い所。さかに細胞が分裂して、表皮の表面に向けて細胞を押し上げている (スライドでは真皮・細胞が分裂が太字)。

□□□ No.66 の図では、表皮の層は、外側から順に
68 ① ・ (②) ・ ③ ・ No.66② ・ No.66① と
★★★ なっている。

- かくしつそう
① 角質層
たんめいそう
② 淡明層
かりゅうそう
③ 顆粒層

スライドで色がついているのは有棘層と基底層なので、まずはこの2つを確実に覚えよう。

□□□ おもな皮膚癌のうち最も多いのは ① だが、悪性
69 度は ② 。① は ③ の細胞が癌化した
★★ もので、④ を形成する。

① 基底細胞癌

② 低い

③ 基底層

④ 結節や潰瘍

まとめ:最も多いが、悪性度は低い。写真は上から基底細胞癌・扁平上皮癌・悪性黒色腫。

・ 基底細胞癌

最も多いが、悪性度は低い
基底層の細胞が癌化したもの
結節や潰瘍を形成する



・ 扁平上皮癌

有棘層の細胞に由来する
かたく浅い潰瘍を伴う鱗状の赤い丘疹
中程度の悪性度



・ 悪性黒色腫

メラノサイトに由来する
非常に高い悪性度(生存率は50%)
発見のためのABCDE



スライド32の写真

□□□ おもな皮膚癌3つのうち、No.69①とNo.72①以外の
70 ① は、② の細胞に由来し、悪性度は
★★★ ③ である。

① 扁平上皮癌

② 有棘層

③ 中程度

まとめ:中程度の悪性度。基底細胞癌(悪性度は低い)と悪性黒色腫(非常に高い)の間(No.69・No.72)。

□□□ No.70①では、かたく浅い ① を伴う、鱗状の
71 ② ができる。
★★

① 潰瘍

② 赤い丘疹

まとめ:かたく浅い潰瘍を伴う鱗状の赤い丘疹(スライドでは「赤い丘疹」が太字)。No.69 の写真(中段)で確認しよう。

□□□ ① は ② に由来する皮膚癌で、悪性度は非
72 常に ③ (生存率は ④)。発見のために
★★ ABCDEが用いられる。

① 悪性黒色腫

② メラノサイト

③ 高い

④ 50%

まとめ:非常に高い悪性度(生存率は50%)。メラノサイトは、メラニンを産生する細胞(No.20)。No.69 の写真(下段)で確認しよう。

- No.72①の発見のためのABCDEのうち、Aは
 73 ① (②) で、形が ③ であることを表
 ★★ す。

① **Asymmetry**ひたいしやうせい
② **非対称性**ふせいけい
③ **不整形**まとめ:A:**Asymmetry**(非対称性):形が不整形。• **Asymmetry** (非対称性)

形が不整形

• **Border** (辺縁)


辺縁が凸凹

• **Color** (色)

様々な色が混じっている

• **Diameter** (直径)

直径が6mm 以上

• **Elevation** (隆起)

スライド33の写真

- No.72①の発見のためのABCDEのうち、Bは
 74 ① (②) で、 ② が ③ であること
 ★★ を表す。

① **Border**へんえん
② **辺縁**でこぼこ
③ **凸凹**まとめ:B:**Border**(辺縁):辺縁が凸凹。

- No.72①の発見のためのABCDEのうち、Cは
 75 ① (②) で、様々な ② が混じっている
 ★ ことを表す。

① **Color**② **色**まとめ:C:**Color**(色):様々な色が混じっている。

- No.72①の発見のためのABCDEのうち、Dは
 76 ① (②) で、 ② が ③ 以上である
 ★★ ことを表す。

① **Diameter**② **直径**③ **6mm**まとめ:D:**Diameter**(直径):直径が6mm以上。

- No.72①の発見のためのABCDEのうち、Eは
 77 ① (②) を表す。
 ★

① **Elevation**りゅうき
② **隆起**まとめ:E:**Elevation**(隆起)。ABCDEの5つを、英語・日本語・内容のセットで覚えよう。

- No.72①の発生部位で最も多いのは ① (②) (③) である。年齢別にみた罹患率は、男女とも
 ★★ ③ から、 ④ になるにつれて高くなる。

そくてい
① **足底**② **足の裏**③ **60歳代**④ **高齢**

まとめ:男女とも60歳代から、高齢になるにつれて高くなる。発生部位は足底のほか、体幹・顔面・首・爪などさまざま。

□□□ No.72①には、① の治療効果があるとされている。
79
★

① オブジーボ
スライドでは**オブジーボ**が青字・太字で強調されている。