

解剖生理学Ⅱ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド33枚) 全58問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

13.皮膚	33枚	58問
-------	-----	-----

□□□ No.2④には ①、② の貯水池として働く。


3

★★

かんげき
① 間隙が多くあり

② 水分や塩類

まとめ: 疎性結合組織には間隙が多くあり、水分や塩類の貯水池として働く(スライドでは「間隙が多くあり」が太字)。



スライド5の図

□□□ No.2①は ① および ② の機能をもち、表面
4 は ③ 。

★

① 分泌

② 吸収
しつじゅん

③ 湿潤である

皮膚の表面は乾燥している(No.13)のと対照的。

□□□ 外界と交通しない ① を覆う上皮性の膜を
5 ② といい、③ と疎性結合組織からできて
★★ いる。② は、④・⑤・⑥ からなる。

たいくう
① 体腔の表面

② 漿膜
しょうまく

③ 単層扁平上皮
たんそうへんぺいじょうひ

④ 腹膜
ふくまく

⑤ 胸膜
きょうまく

⑥ 心膜
しんまく

外界と交通する所を覆う粘膜(No.2)とは逆に、漿膜は外界と交通しない所を覆う。スライドでは「体腔の表面」が太字、腹膜・胸膜・心膜が青字・太字。

□□□ No.5②のうち、①を覆う部分を②、
 6 ③を覆う部分を④という。また、No.5②は
 ★★★ ⑤を分泌して、⑥。

① 臓器の表面

② 臓側漿膜


③ 体腔の内面

④ 壁側漿膜

⑤ 漿液

⑥ 摩擦を防ぐ

図では、腹膜を例に壁側腹膜と臓側腹膜が示されている。



スライド6の図


□□□ 関節を包む線維性被膜を①といい、②を
 7 分泌し、③。
 ★

① 滑膜

② 滑液

③ 衝撃を吸収する

人体の膜のうち、結合組織の膜はこの滑膜（スライド2）。図で、関節腔・関節軟骨と滑膜の位置を確認しよう。



スライド7の図

外皮と外皮系の機能

□□□ 皮膚と ① を合わせて ② という。

8

★

- ① 付^ふ属^{ぞく}器^き
② 外^{がい}皮^ひ

付属器として、脂腺・汗腺(スライド13~16)と、毛・爪(スライド17・18)を学ぶ。

□□□ No.8②の機能の1つは、人体の ① を保護する

9

★★

ことで、②・③・④・⑤・
⑥・⑦ から守っている。

- ① 深部組織
② 物理的圧力
③ 化学物質
④ 細菌感染
⑤ 紫外線
⑥ 温熱・寒冷
⑦ 乾燥

外皮系の機能は、この保護のほかに3つある(No.11)。守る相手のうち3つについては、守るしくみも覚える(次の問題)。

□□□ 外皮系による保護では、No.9②に対しては ①

10

★★

がクッションとなり、No.9④に対しては ② と
③ (汗)が、No.9⑤に対しては ④ が守って
いる。

- ① 脂肪組織
② 表皮
③ 酸性の分泌物
④ メラニン色素

まとめ：脂肪組織がクッション、表皮と酸性の分泌物(汗)、メラニン色素。スライドでは脂肪組織と酸性が青字・太字。汗が酸性であることは、エクリン汗腺の汗(No.25)でも学ぶ。メラニン色素は、表皮のメラノサイトが産生する(No.16)。

□□□ 外皮系の機能には、保護のほかに、①、汗による②・③の排泄、皮膚内の④からの

11

★★

⑤の合成がある。

重要

- ① 体温調節
② 尿^{によう}素^そ
③ 尿^{によう}酸^{さん}
④ コレステロール
⑤ VitD(ビタミンD)

まとめ：体温調節／尿素・尿酸の排泄(汗による)／VitD(ビタミンD)の合成(皮膚内のコレステロールから)。スライドでは尿素・尿酸・VitDが赤字・太字。


皮膚の構造

- 皮膚は ① と ② の2種類の組織からなる。
 12 表層の ① は ③、その下の ② は
 ★★★ ④ でできている。

重要

- ひょうひ
 ① 表皮
 しんぴ
 ② 真皮
 かくかじゅうそうへんべいじょうひ
 ③ 角化重層扁平上皮
 ちみつげつごうそしき
 ④ 緻密結合組織

図で、表皮・真皮・皮下組織の位置を確認しよう。表皮にはケラチノサイトとメラノサイトがある。



スライド10の図

- No.12②の下には、① に富む ② があり、
 13 ③ でできている。皮膚の表面は ④ 。

★★

重要

- ① 脂肪組織
 ② 皮下組織
 そせいけつごうそしき
 ③ 疎性結合組織
 ④ 乾燥している

まとめ: 真皮の下に脂肪組織に富む皮下組織がある。皮膚の表面が乾燥しているのは、粘膜の表面が湿潤である(No.4)のと対照的。



スライド3の図

- 表皮には ①。表皮細胞のほとんどは ② (③) からなり、表皮は ④ でそっくり入れ替わる。
 14
 ★★

- ① 血管がない
 ② ケラチノサイト
 ③ 角化細胞
 ④ 約1ヶ月

表皮には、ほかにメラニン色素を産生するメラノサイトがある(No.16)。

□□□ 真皮は、人体を包む ① 膜である。② や
15 ③ で厚く、④ で薄い。
★★

- ① 丈夫で伸縮性に富んだ
② 手掌^{しゅしょう}
③ 足底^{そくてい}
④ 眼瞼^{がんげん}

まとめ:真皮は人体を包む丈夫で伸縮性に富んだ膜で、手掌や足底で厚く、眼瞼で薄い(スライドでは太字・下線)。革製品は動物の真皮である。

皮膚の色の決定因子

□□□ 皮膚の色の決定因子の1つは、紫外線から皮膚を守る ① である。① は、表皮にある ② に
16 によって産生される。
★

重要

- ① メラニン(メラニン色素)
② メラノサイト

メラニン色素は、外皮系の保護でも紫外線から守る働きをしていた(No.10)。

□□□ ① の ② は、人種で差はない。肌の色が異なるのは、③ と ④ による。
17
★★

- ① メラノサイト
② 数
③ メラニン量^{かりゅう}
④ メラニン顆粒の大きさ

まとめ:メラノサイトの数は人種で差はない(スライドでは下線)。メラニン量とメラニン顆粒の大きさが肌の色が異なる(スライドでは青字・太字・下線)。

□□□ 皮膚の色は、① の酸素化の程度によっても変わる。① の酸素飽和度が低いと、② になる。
18
★

重要

- ① ヘモグロビン
② チアノーゼ

スライドでは、皮膚の色の決定因子としてメラニン・ヘモグロビン・胆汁色素(ビリルビン)・カロチンの4つがあげられている(どれも赤字・太字)。

□□□ ① (②)や③ も、皮膚の色の決定因子である。血中の② が上昇すると④ になる。③ は⑤ にある。
19
★★

重要

- ① 胆汁色素^{たんじゅうしきそ}
② ビリルビン
③ カロチン
④ 黄疸^{おうだん}
⑤ 皮下組織


まとめ:血中ビリルビン上昇による黄疸、皮下組織のカロチン。

脂腺・汗腺

- 皮膚の外分泌腺には ① と ② があり、どちらも ③ に形成されている。
20
★

- ① ^{しせん}脂腺
② ^{かんせん}汗腺
③ 真皮の深層

図で、脂腺と汗腺の位置を確認しよう。




スライド14の図

- No.20②には、① と ② の2種類がある。
21
★
重要

- ① エクリン汗腺
② アポクリン汗腺

図で、2種類の汗腺の違いを確認しよう(くわしくはNo.24～No.27)。



スライド16の図

- 脂腺は、① と ② を除く皮膚の全域に分布し、腺管は③ ないしは皮膚表面に開口する。また、④ の作用で活発化する。
22
★★

- ① ^{しゅしょう}手掌
② ^{そくてい}足底
③ ^{もうほう}毛包
④ 男性ホルモン

まとめ: 手掌と足底を除く皮膚の全域に分布(スライドでは太字・下線)、毛包ないしは皮膚表面に開口。

□□□ 脂腺は ① (② と ③) を分泌し、皮膚
23 の ④ と ⑤ がある。
★★

- ① ^{ひし} 皮脂
② 脂質
③ ^{ざんがい} 細胞の残骸
④ ^{じゅんかつさよう} 潤滑作用
⑤ 殺菌作用

脂腺の腺管が **皮脂** でつまり、さらに **炎症** を伴ったものが **尋常性ざ瘡** (No.38)。

□□□ エクリン汗腺は ① から汗を分泌する。汗には
24 ②、③ (④・⑤)、⑥ が含
★★ まれる。

- ① ^{かんこう} 汗孔
② NaCl
③ 代謝産物
④ 尿素
⑤ 尿酸
⑥ 乳酸

尿素・尿酸の排泄は、外皮系の機能の1つ (No.11)。

□□□ エクリン汗腺の汗は ① (②) で、③
25 がある。この汗腺は ④ に働き、⑤ の支配を
★★★ 受ける。

- ① 酸性
② pH4~6
③ 殺菌作用
④ 体温調節
⑤ 交感神経

まとめ: **酸性 (pH4~6) → 殺菌作用、体温調節 (交感神経支配)**。汗が **酸性** であることは、**細菌感染** からの保護にも役立つ (No.10)。

□□□ アポクリン汗腺は ① に分布し、② に開口
26 する。分泌物は ③ を含み、④ によって臭
★★★ う。

- ① ^{えきか えいんぶ} 腋窩や会陰部
② ^{もうほう} 毛包
③ 脂肪酸や蛋白質
④ 細菌

エクリン汗腺が **汗孔** から汗を分泌するのに対し、**アポクリン汗腺** は **毛包** に開口する。まとめ: **細菌** によって臭う。

□□□ アポクリン汗腺は ① で活発化し、②・
27 ③・④ で活動が亢進する。
★★

- ① 男性ホルモン
② ^{どうつう} 疼痛
③ ストレス
④ 性交渉


男性ホルモン で活発化するのは、**脂腺** も同じ (No.22)。

毛と爪

- 毛は上皮に由来する構造物で、の部分で形
 28 成される。毛は、に包まれたの部分
 ★★ と、皮膚の外に出ているの部分からなる。

- もうほう
 ① 毛包
 もうこん
 ② 毛根
 もうかん
 ③ 毛幹

図で、毛包・毛根・毛幹の位置を確認しよう。図の右上は毛を拡大したもので、最表面がキューティクル、その内側に毛皮質・毛髄質がある。



スライド17の図

- 成人の・・の成長は、
 29 を受ける。
 ★

- とうもう
 ① 頭毛
 ちもう
 ② 恥毛
 えきもう
 ③ 腋毛
 ④ ホルモンの影響

スライドでは「ホルモンの影響」が太字。脂腺・アポクリン汗腺も男性ホルモンで活発化する(No.22・No.27)ので、ホルモンとの関係をまとめて覚えよう。

- 毛の最表面にある()は、屋根瓦のよう
 30 うに重なり合った一層の細胞層からなり、の
 ★★ を防いでいる。が損傷を受けると、毛内部の
がほつれてになる。

- ① キューティクル
 もうしょうひ
 ② 毛小皮
 ③ 毛が絡み合う
 ④ ケラチン線維
 えだげ
 ⑤ 枝毛

まとめ:毛が絡み合うのを防ぐ。No.28 の図の右上で、毛の最表面のキューティクルを確認しよう。

- 毛包では、とよばれるが真皮に付着
 31 している。寒さや恐怖でが興奮しての
 ★★ が収縮すると、毛が立ってし、になる。


- りつもうきん
 ① 立毛筋
 ② 平滑筋
 ③ 交感神経
 ④ 毛穴の周囲が少し隆起
 りゅうき
 ⑤ 鳥肌

まとめ:毛が立って毛穴の周囲が少し隆起する=鳥肌(スライドでは交感神経・鳥肌が青字・太字)。No.28 の図で、立毛筋の位置を確認しよう。

- 爪は上皮が^{りんじょう}鱗状に変化したもので、角化した
 32 ① 板からなる。爪は ② で細胞が増殖し、
 ★★ 死んだ細胞がかたい ① に変化して、押し出されることによって作られる。

① **ケラチン**
 ② **爪母基(そうぼき)**

図で、**爪母基・爪床・爪半月**の位置を確認しよう。



スライド18の図

- 爪の裏には ① があり、② を作っている。
 33
 ★★★

① **表皮の基底層**
 ② **爪床(そうしょう)**

基底層は、表皮の一番深い所にある層(No.49)。

- 爪の大部分は、下を通っている ① のためピンク
 34 色をしているが、② の部分は白っぽく見える。こ
 ★★★ れは ③ からで、④ 。

① **毛細血管**
 ② **爪半月(つめはんげつ)**
 ③ **上皮が十分に角化していない**
 ④ **健康状態とは関係無い**

No.32 の図の右側(爪を上から見た図)で、**爪半月**の位置を確認しよう。

皮膚の疾患(炎症)

- ① は ② の感染によって起こる皮膚炎で、
 35 ③ に^{そうよう ぼっせき}掻痒・発赤・表皮剥離^{はくり}を伴う。
 ★★

^{あしはくせん}① **足白癬**
^{しんきん}② **真菌**
^{そくしかん}③ **足趾間**

まとめ:**真菌感染**。スライドでは「**足趾間**」が太字。写真は上から**足白癬・単純ヘルペス・膿痂疹**。

- ・ **足白癬**
 真菌感染
 足趾間に掻痒・発赤・表皮剥離を伴う
- ・ **単純ヘルペス**
 単純ヘルペスウイルスの感染
 疼痛・掻痒を伴う水疱を伴う
 口唇・口腔粘膜に見られる
- ・ **膿痂疹(とびひ)**
 連鎖球菌の感染。学童期に多い
 口や鼻の周囲に多く見られ、発赤を伴う小水泡
 破れると黄色の痂皮(かさぶた)を形成する



スライド21の写真

□□□ ① は ② の感染によって起こる皮膚炎で、
 36 疼痛・掻痒を伴う ③ ができる。④ ・ ⑤
 ★★ に見られる。

- ① 単純ヘルペス
 ② 単純ヘルペスウイルス
 ③ 水疱 すいほう
 ④ 口唇 こうしん
 ⑤ 口腔粘膜 こうくうねんまく

スライドでは、水疱と口唇・口腔粘膜が太字。No.35 の写真(中段)で確認しよう。

□□□ ① (②) は、③ によって起こる皮膚炎
 37 で、④ に多い。⑤ に多く見られ、⑥ が
 ★★★ できる。これが破れると、黄色の痂皮(かさぶた)を形成する。

- ① 膿痂疹 のうかしん
 ② とびひ
 ③ 連鎖球菌の感染 れんさきゅうきん
 ④ 学童期
 ⑤ 口や鼻の周囲
 ⑥ 発赤を伴う小水疱 はっせき しょうすいほう

※スライドでは「小水疱」と書かれているが、皮膚の水ぶくれは「小水疱」と書く。No.35 の写真(下段)で確認しよう。

□□□ ① (②) は、いわゆる「③」のことで、
 38 ④ の腺管が皮脂でつまり、さらに④ に
 ★ ⑤ を伴う。癬痕を残すこともある。

- ① 尋常性ざ瘡 じんじょうせいざそう
 ② Acne
 ③ にきび
 ④ 脂腺 しせん
 ⑤ 炎症

脂腺は皮脂を分泌する(No.23)。脂腺の炎症を伴うのがポイント(スライドでは「炎症」が太字)。



スライド22の写真

熱傷

□□□ 皮膚の蛋白質が変性したり、細胞が死んだ状態を
 39 ① といい、その面積を推定する方法として
 ★ ② がある。

- ① 熱傷 ねっしょう
 ② 9の法則

「9の法則」の中身は No.41 で学ぶ。

□□□ No.39①から生じる問題点の1つは ① で、
 40 ① → ② → ③ となる。もう1つは
 ★★★ ④ で、⑤ に起こる。


- ① 体液の損失
- ② 水・電解質の異常
- ③ ショック状態
- ④ 感染症
- ⑤ 受傷数日後

まとめ: 体液の損失→水・電解質の異常→ショック状態、感染症(受傷数日後)。

□□□ 熱傷面積を推定する「9の法則」では、全身に占める
 41 割合を、顔面・頭部・頸部が ①、上肢(左右あわ
 ★★★ せて)が ②、体幹(前面と後面をあわせて)が
③、会陰部が ④、下肢(左右あわせて)が
⑤ とする。

- ① 9%
- ② 18%
- ③ 36%
- ④ 1%
- ⑤ 36%

図のとおり、**体幹前面は18%**。合計すると $9+18+36+1+36=100\%$ になる。



スライド24の図

□□□ 熱傷はⅠ～Ⅲ度に分類される。Ⅰ度は 、Ⅱ度は
42 、Ⅲ度は である。
★★

- ① 表皮の損傷
② 表皮と真皮の損傷
③ 皮膚全層の損傷

No.12 の図で、**表皮・真皮**の位置を確認しよう(スライドでも、この分類の直前に皮膚の構造の図が再び示されている)。

I 度	 • 表皮の損傷 • 発赤と腫脹 • 日焼けなど
II 度	 • 表皮と真皮の損傷 • 発赤、腫脹、水泡形成 • 残存した表皮組織がある
III 度	 • 皮膚全層の損傷 • 灰白色〜黒色 (羊の皮様) • 痛覚が無い

スライド26の写真

□□□ Ⅰ度熱傷では、表面から と が観察さ
43 れ、代表例は ()である。Ⅱ度熱傷で
★★ は、これらに加えて が見られ、局所には
 がある。

- ① 発赤
ほっせき
② 腫脹
しゅちよう
③ 日焼け
④ サンバーン
すいほう
⑤ 水泡
⑥ 残存した表皮組織

スライドでは**日焼け(サンバーン)**が赤字。No.42 の写真で、Ⅰ度・Ⅱ度のようすを確認しよう。

□□□ Ⅲ度熱傷では、局所は ()となる。
44 も破壊されるので 。また、 は
★★★ なく、 が必要である。

- ① 灰白色〜黒色
かいはくしよく
② 羊の皮様
③ 感覚受容器
④ 痛覚が無い
⑤ 上皮組織
しよくひじゆつ
⑥ 植皮術

まとめ: **痛覚が無い**(スライドでは太字・下線)のは、**感覚受容器も破壊されるから。上皮組織はなく、植皮術が必要。**

□□□ 重症熱傷とされるのは、Ⅱ度の熱傷が全身の
45 以上、Ⅲ度の熱傷が全身の 以上、または
★★★ ・・のⅢ度の熱傷である。

- ① 25%
② 10%
③ 顔面
④ 手
⑤ 足

まとめ: **Ⅱ度の熱傷が全身の25%以上／Ⅲ度の熱傷が全身の10%以上／顔面・手・足のⅢ度の熱傷。**

- No.45③～⑤のうち、頭部にある部位の熱傷では
 46 ① を合併していることが多く、② による窒息
 ★★ 息を起こすので注意する。また、四肢の関節部位の熱傷では、③ による ④ の障害を引き起こす。

- ① 気道熱傷
 ② 喉頭浮腫
 ③ 瘢痕形成
 ④ 関節運動

まとめ: 顔面の熱傷では気道熱傷を合併していることが多い→喉頭浮腫による窒息。手足の関節部位の熱傷→瘢痕形成による関節運動の障害(スライドでは青字・太字・下線)。

褥瘡

- 自分の意思で寝返りや体位変換ができない患者に
 47 みられる皮膚の障害を ① という。体重により
 ★ ② が圧迫されて ③ を引き起こし、皮膚の
 ④ や ⑤ を生じる。

- ① 褥瘡(じょくそう)
 ② 骨に近い皮膚
 ③ 血流障害
 ④ 壊死
 ⑤ 潰瘍

まとめ: 体重により骨に近い皮膚が圧迫され血流障害→皮膚の壊死や潰瘍(スライドではどれも太字)。写真は褥瘡の例。




スライド29の写真

- No.47①がでしやすい部位として、図では、^{ぎょうがい}仰臥位
 48 (仰向き)では ① (お尻の上部の中央)や
 ★★ ② (かかと)、横臥位(横向き)では ③ (太
 ももの付け根の外側)などが示されている。

- ① 仙骨部
 ② 踵部
 ③ 大転子部

図の赤色の部分が、人間の体のなかで圧迫を受けやすく
褥瘡のできやすいところ(どれも**骨に近い皮膚**)。ほかに、仰
 臥位では肩甲骨部・肘関節部、横臥位では耳介部・肩鎖関
 節部などが示されている(スライドの図には、^{ふくがい}腹臥位(うつ
 伏せ)と坐位の例もある)。




スライド29の図(左半分)

表皮の構造と皮膚癌

- 表皮の一番深い所にある層を ① といい、その上
 49 に ② がある。
 ★
 重要

- ① 基底層
 ② 有棘層

図で、**基底層**と**有棘層**の位置を確認しよう。



スライド31の図

- No.49①は ① と接している。No.49①では、さ
 50 かに細胞が ② して、③ に向けて細胞を
 ★ 押し上げている。

- ① 真皮
 ② 分裂
 ③ 表皮の表面

まとめ:表皮の一番深い所は**真皮**に近い所。さかに**細胞**
が分裂して、表皮の表面に向けて細胞を押し上げている
 (スライドでは**真皮・細胞が分裂**が太字)。

□□□ No.49 の図では、表皮の層は、外側から順に
 51 ①・(②)・③・No.49②・No.49①と
 ★★★ なっている。

- かくしつそう
 ① 角質層
 たんめいそう
 ② 淡明層
 かりゅうそう
 ③ 顆粒層

スライドで色がついているのは有棘層と基底層なので、まずはこの2つを確実に覚えよう。

□□□ おもな皮膚癌のうち最も多いのは ① だが、
 52 ②。①は③の細胞が癌化したもの
 ★★ で、④を形成する。

- ① 基底細胞癌
 ② 悪性度は低い
 ③ 基底層
 けっせつ かいよう
 ④ 結節や潰瘍

写真は上から基底細胞癌・扁平上皮癌・悪性黒色腫。

- 基底細胞癌
最も多いが、悪性度は低い
基底層の細胞が癌化したもの
結節や潰瘍を形成する
- 扁平上皮癌
有棘層の細胞に由来する
かたく浅い潰瘍を伴う鱗状の赤い丘疹
中程度の悪性度
- 悪性黒色腫
メラノサイトに由来する
非常に高い悪性度（生存率は50%）
発見のためのABCDE



スライド32の写真

□□□ ①は②の細胞に由来する皮膚癌で、かた
 53 く浅い③を伴う④ができる。悪性度は
 ★★★ ⑤である。

- へんぺいじょうひがん
 ① 扁平上皮癌
 ゆうきよくそう
 ② 有棘層
 かいよう
 ③ 潰瘍
 りんじょう きゅうしん
 ④ 鱗状の赤い丘疹
 ⑤ 中程度

まとめ：中程度の悪性度。基底細胞癌（悪性度は低い）と悪性黒色腫（非常に高い）の間（No.52・No.54）。

□□□ ①は②に由来する皮膚癌で、悪性度は非
 54 常に③（生存率は④）。発見のために
 ★★ ABCDEが用いられる。

- あくせいこくしよくしゅ
 ① 悪性黒色腫
 ② メラノサイト
 ③ 高い
 ④ 50%

まとめ：非常に高い悪性度（生存率は50%）。メラノサイトは、メラニンを産生する細胞（No.16）。No.52 の写真（下段）で確認しよう。

□□□ No.54①の発見のためのABCDEのうち、Aは
 55 ① (②) で、形が ③ であること、Bは
 ★★ ④ (⑤) で、⑤ が ⑥ であることを表す。

① **Asymmetry**

② **非対称性**
ひたいしょうせい

③ **不整形**
ふせいけい

④ **Border**

⑤ **辺縁**
へんえん

⑥ **凸凹**
でこぼこ

まとめ:A:**Asymmetry**(非対称性):形が**不整形**／B:
Border(辺縁):**辺縁が凸凹**。

・ **Asymmetry** (非対称性)

形が不整形

・ **Border** (辺縁)

辺縁が凸凹


・ **Color** (色)

様々な色が混じっている

・ **Diameter** (直径)

直径が6mm 以上

・ **Elevation** (隆起)



スライド33の写真

□□□ No.54①の発見のためのABCDEのうち、Cは
 56 ① (②) で、③ こと、Dは ④ (⑤)
 ★★★ ⑤) で、⑤ が ⑥ 以上であること、Eは
 ⑦ (⑧) を表す。

① **Color**

② **色**

③ **様々な色が混じっている**

④ **Diameter**

⑤ **直径**

⑥ **6mm**

⑦ **Elevation**

⑧ **隆起**
りゅうき

まとめ:C:**Color**(色):**様々な色が混じっている**／D:
Diameter(直径):**直径が6mm以上**／E:**Elevation**(隆起)。

□□□ No.54①の発生部位で最も多いのは ① (②)
 57 (③) である。年齢別にみた罹患率は、男女とも
 ★★ ③ から、④ なる。

① **足底**
そくてい

② **足の裏**

③ **60歳代**

④ **高齢になるにつれて高く**

まとめ:男女とも**60歳代**から、**高齢になるにつれて高くなる**。発生部位は**足底**のほか、体幹・顔面・首・爪などさまざま。

□□□ No.54①には、① の治療効果があるとされている。
 58
 ★

① **オブジーボ**

スライドでは**オブジーボ**が青字・太字で強調されている。