

解剖生理学Ⅰ 血液 part2(血液疾患) 赤シート一問一答

出典:解剖生理(血液 part2).pdf(スライド10枚) 全27問

使い方: **赤い文字**を赤シートで隠して答える。正解したら右の口に✓(3回分)。

スライドの赤字・青字・太字の箇所から作成。★=赤字かつ太字(最優先で覚える)

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
貧血			
1 ★	①赤血球の異常で主なもの ②①の定義	① 貧血 ②肺から末梢組織へ十分な酸素を運搬するHb(ヘモグロビン)量が不足している状態	☐ ☐ ☐
2	貧血の3つの症状	頻脈・動悸・運動時の息切れ	☐ ☐ ☐
3	スライドに挙げられている貧血の種類5つ	鉄欠乏性貧血・悪性貧血・葉酸欠乏症・再生不良性貧血・溶血性貧血	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	①最も一般的な貧血 ②1日あたり必要な鉄の摂取量 ③女性が①になりやすい理由3つ ※②は教科書によって数値が異なるが、試験はスライドどおり	① 鉄欠乏性貧血 ② 2~3mg ③ 月経期間中の失血・妊娠中の胎児への鉄供給・偏食	☐ ☐ ☐ ☐
5	①欠乏すると赤血球の正常な成熟が損なわれるビタミン2つ ②欠乏の原因2つ ③赤血球への影響	① ビタミンB12・葉酸 ② 摂取不足・吸収障害 ③ 赤血球の正常な成熟が損なわれ、赤血球の生成抑制と寿命短縮が起こる	☐ ☐ ☐ ☐
6	①胃粘膜の萎縮により、ビタミンB12の吸収に必要な物質を分泌する細胞が破壊されて起こる貧血 ②その物質 ③胃粘膜が萎縮する病気	① 悪性貧血 ② 内因子 ③ 萎縮性胃炎	☐ ☐ ☐ ☐
7	①全ての血球が減少する貧血 ②①で破壊されるもの ③①の原因3つ ④全ての血球が減少する状態の名称	① 再生不良性貧血 ② 骨髄の造血細胞 ③ 放射線・薬剤・感染症 ④ 汎血球減少症	☐ ☐ ☐ ☐
8	溶血性貧血の ①定義 ②例3つ	① 赤血球が老化する前に破壊されてしまう状態 ② 不適合輸血・新生児溶血性疾患・鎌状赤血球症	☐ ☐ ☐ ☐
鎌状赤血球症			
9	鎌状赤血球症の ①特徴(遺伝性か・多い人種) ②原因(ヘモグロビンの何が変化する?)	① 遺伝性の貧血・黒人に多い ② グロビン蛋白のアミノ酸がたった1つ変化する	☐ ☐ ☐ ☐
10	鎌状赤血球症で ①赤血球が鎌状になるのはどんなとき ②発症しやすい状況3つ ③鎌状の赤血球に起こること2つ	① 酸素濃度が低下して、Hbから酸素が外れたとき ② 高地(酸素濃度が低い場所)・激しい運動・ストレス ③ 早期に溶血する・細い血管に詰まる	☐ ☐ ☐ ☐
11	鎌状赤血球症の人が発症しにくい感染症と、その理由	マラリア 鎌状赤血球は寿命が短く、マラリア原虫が赤血球内で成熟する前に溶血が起こるから	☐ ☐ ☐ ☐
白血病			
12	白血病とは何のがんか	白血球前駆細胞のがん(制御不能な増殖)	☐ ☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
13	白血病の3つの症状と、それが起こる理由	易感染性・貧血・出血傾向 他の血球の産生が抑えられるから	☐ ☐ ☐
14	白血病の原因3つ(ウイルスは名称と、スライドで()内に書かれた略語も) ※ATLはこのウイルスが起こす「成人T細胞白血病」。ウイルスの略称を聞かれたら HTLV-1	放射線・ウイルス感染(ヒトT細胞白血病ウイルス(ATL))・遺伝的要因	☐ ☐ ☐
15	次の年齢に好発する白血病 ①小児 ②20～40歳 ③50～70歳の男性 ※②の年齢は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり	①急性リンパ性白血病 ②慢性骨髄性白血病 ③慢性リンパ性白血病	☐ ☐ ☐
16	①白血病が疑われるとき、特殊な針で骨髄を採取して調べる検査 ②針を刺す骨(どんな骨か・例2つ)	①骨髓穿刺 ②体表に近い扁平骨(胸骨・腸骨)	☐ ☐ ☐
血栓と治療薬			
17	①正常な血管内で血液が凝固してできた塊 ②①が剥離して血流に流れ出したもの ③①②が血流を遮断して起こる病気3つ	①血栓 ②塞栓 ③狭心症・心筋梗塞・脳梗塞	☐ ☐ ☐
18 ★	次の薬の作用 ①アスピリン ②ヘパリン ③ワーファリン	①止血第一段階の血管収縮と、第二段階の血小板凝集を抑える ②止血第三段階の血液凝固反応を抑える ③ビタミンKに拮抗して、血液凝固因子の合成を抑制する	☐ ☐ ☐
19	ワーファリンを服用している患者が食べてはいけない食品と、その理由	納豆 ビタミンKが大量に含まれ、ワーファリンの作用を弱めてしまうから	☐ ☐ ☐
20	①血栓を溶かす酵素 ②①が必要になるまで血液中を循環している不活性型 ③②を①に変換する因子(略称も) ④③をつくる細胞	①プラスミン ②プラスミノゲン ③組織プラスミノゲンアクチベーター(組織プラスミノゲン活性化因子)/tPA ④血管内皮細胞(血管の細胞)	☐ ☐ ☐
21	①No.20③を投与して血栓を溶かす治療の対象となる病気2つ ②薬剤として使うNo.20③を大量につくる方法	①心筋梗塞・脳梗塞 ②その遺伝子(cDNA)を発現ベクターに組み込んで大腸菌に入れ、大量に生産させる(=組換えtPA蛋白)	☐ ☐ ☐
血小板と止血系の異常			
22	①血小板が不足し、小血管から出血して点状出血斑を生じる疾患 ②①の原因2つ	①血小板減少症 ②血小板に対する抗体が産生される(自己免疫性)・白血病や放射線の被曝による骨髓機能の低下	☐ ☐ ☐
23	①肝臓で凝固因子を合成するのに必要なビタミンが不足する疾患 ②①で低下するもの	①ビタミンK欠乏症 ②(肝臓での)凝固因子の合成	☐ ☐ ☐
24	DICの ①日本語名 ②原因(例2つ) ③出血傾向が起こるしくみ	①播種性血管内凝固 ②細菌感染によるショック・重傷外傷(など多くの疾患の合併症として起こる) ③血管内で血液凝固系が活性化 → 多発性の微小血栓ができる → 凝固因子や血小板が消費される → 出血傾向	☐ ☐ ☐
25 ★	①ある特定の血液凝固因子をつくれない遺伝病 ②その遺伝形式 ③原因遺伝子がある染色体	①血友病 ②伴性劣性遺伝 ③X染色体	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
26	No.25①が男性に発症し、女性は発症しない理由	男性はX染色体が1本しかなく、異常があるとすぐ発症する。女性はもう1本のX染色体が働くため、保因者にはなるが発症しない	☐ ☐ ☐
27	No.25①の治療法と、以前起きた社会問題	新鮮な血漿輸血・凝固因子の投与 HIVや肝炎ウイルスに汚染された血液が混じり、感染する患者が続出した	☐ ☐ ☐