

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド39枚) 全55問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

2.運動器part2	39枚	55問
------------	-----	-----

2 運動器part2

出典:解剖生理(運動器 part2).pdf(スライド39枚) 全55問

頭蓋の構成と縫合

□□□ 頭蓋は ① と ② の2つの部分からなる。

1 ① は、脳の組織を包んで ③ する。

★

- のうとうがい
① 脳頭蓋
がんめんとうがい
② 顔面頭蓋
③ 保護

スライドの文は「**脳頭蓋は脳の組織を包んで保護する**」。見出しでは「**～脳を保護～**」と、ひと言でまとめられている。

□□□ No.1の②には ① が付着し、② を創る。

2

★

- ① 顔面筋
② 表情

見出しでは「**～顔面筋が付着し表情を創る～**」。スライド73の本文では「**顔面頭蓋は顔面筋による表情を可能にしている**」。

□□□ No.1の①は ① の骨からなる。このうち、左右1


3 対ある骨は ② と ③ である。

★★

重要

- ① 6種類8個
とうちようこつ
② 頭頂骨
きくとうこつ
③ 側頭骨

頭頂骨と側頭骨は左右1対ずつあるので、全部で**6種類8個**になる。図で6つの骨の位置を確認しよう。



スライド58の図(頭蓋を横から見たところ)

□□□ No.1の①のうち、1個だけある骨は ① ・ ②

4 ・ ③ ・ ④ の4つである。

★★

重要

- ぜんとうこつ
① 前頭骨
こうとうこつ
② 後頭骨
ちようけいこつ
③ 蝶形骨
しこつ
④ 篩骨

No.3の図で、4つの骨の位置を確認しよう(**蝶形骨と篩骨**は、頭蓋の内面を見たNo.17の図のほうが分かりやすい)。

□□□ No.1の②は の骨からなる。このうち、1個だけある骨は と である。

★★★

重要

① 8種類14個


かがくこつ

② 下顎骨

じょこつ

③ 鋤骨

下顎骨・鋤骨(1個ずつ)と、左右1対ある骨(次の2問)を合わせて、全部で8種類14個になる。※教科書によってはNo.33の骨も顔面頭蓋に含めるが、試験はスライドどおり(含めない)。



スライド78の図(頭蓋を前から見たところ)

□□□ No.1の②のうち左右1対ある骨で、頭蓋を横から見た図(No.3の図)に出ているものは、・

★★★

・・の4つである。

重要

じょうがくこつ

① 上顎骨

きょうこつ

② 頬骨

るいこつ

③ 涙骨

ひこつ

④ 鼻骨

スライド74には「8種類の顔面頭蓋のうち、口蓋骨、下鼻甲介、鋤骨以外の5種類が示されている」とある(もう1つは1個だけの下顎骨)。No.3の図で、4つの骨の位置を確認しよう。

□□□ No.1の②のうち左右1対ある骨で、No.3の図に出ていない2つは、とである。

★★★

重要

こうがいこつ

① 口蓋骨

かびこうかい

② 下鼻甲介

まとめ: 上顎骨・口蓋骨・頬骨・涙骨・鼻骨・下鼻甲介(以上6つは左右1対ずつ)。口蓋骨は頭蓋を下から見た図(No.14の図)、下鼻甲介は前から見た図(No.5の図)で確認しよう。

□□□ 顔面頭蓋のなかでただ1つ、残りの頭蓋全体に対して自由に動く関節を作っている骨は である。

★

 は顔面の両側で と を作る。

重要

 以外の頭蓋骨どうしは、 という不動性の関節によって集合している。

かがくこつ

① 下顎骨

さくとうこつ

② 側頭骨

がくかんせつ

③ 顎関節

はうこつ

④ 縫合

縫合の名前は次の問題。No.3の図で、下顎骨と側頭骨の位置を確認しよう。

□□□ 頭頂骨は、左右が正中線で **①**、前頭骨との間
 9 は **②**、後頭骨との間は **③**、側頭骨との間
 ★★★ は **④** で連結している。

- しじょうほうごう
① 矢状縫合
 かんじょうほうごう
② 冠状縫合
 ③ ラムダ縫合
 りんじょうほうごう
④ 鱗状縫合

No.3の図(左側の緑色の四角いラベル)で、4つの縫合の位置を確認しよう。新生児では、骨と骨の間に**泉門**がある(No.40)。


脳頭蓋の骨の特徴

□□□ **①** には、音が入る穴である **②** と、その直下
 10 にある突起の **③** がある。**③** には **④** が
 ★★ 付着する。

重要

- そくとうこつ
① 側頭骨
 がいじどう
② 外耳道
 けいじょうとつき
③ 茎状突起
④ 頸部の筋

茎状突起には頸部の筋が付着する。図で、外耳道・茎状突起などの位置を確認しよう。



スライド74の図(側頭骨のまわりを拡大)

□□□ No.10の骨にはほかに、**①** と橋渡しする骨の橋
 11 である **②** がある。
 ★

- きょうこつ
① 頬骨
 きょうこつきゅう
② 頬骨弓

スライドでは「**頬骨弓**: 頬骨と橋渡しする骨の橋」。No.10の図で、**頬骨弓**の位置を確認しよう。

□□□ 音が入る穴(No.10の②)の後下方にある突起を
 12 **①** といい、**②** などの **③** が付着する。
 ★★

- にゅうようとつき
① 乳様突起
 きょうさになゅうとつきん
② 胸鎖乳突筋
③ 頸部の筋

乳様突起には頸部の筋(胸鎖乳突筋など)が付着する。No.10の図で、外耳道の後下方にある**乳様突起**の位置を確認しよう。

- No.12の①の突起の内部には多数の①があ
 13 る。これを②といい、③に併発して炎症が
 ★★ 起こりやすい。


- ① 空洞
 にゅうとつどう
 ② 乳突洞
 ちゅうじえん
 ③ 中耳炎

スライドでは「内部に多数の空洞がある(乳突洞)→中耳炎に併発して炎症が起こりやすい」。No.10の図では、乳様突起のラベルの下に(乳突洞)と書かれている。

- ①には、②(脳と脊髄の間の部分)を囲ん
 14 でいる大きな孔の③がある。
 ★★
 重要

- こうとうこつ
 ① 後頭骨
 のうかん
 ② 脳幹
 だいかうとうこつ
 ③ 大後頭孔

※②は、一般的な教科書では「延髄」と書かれることが多いが、試験はスライドどおり。図で位置を確認しよう。



スライド63の図(頭蓋を下から見たところ)

- No.14の骨には、脊柱の最上部の骨である①
 15 と関節を作る②がある。
 ★★

- ① 第一頸椎
 こうとうか
 ② 後頭顆

No.14の図で、大後頭孔のすぐ横にある後頭顆を確認しよう。

- No.10の骨とNo.14の骨の間にある穴を①と
 16 いい、②の通路になっている。その前方にある
 ★★ ③には、④が通る。


- けいじょうみやくこう
 ① 頸静脈孔
 ないけいじょうみやく
 ② 内頸静脈
 けいどうみやくかん
 ③ 頸動脈管
 ないけいどうみやく
 ④ 内頸動脈

No.14の図(頭蓋を下から見たところ)で、頸動脈管と頸静脈孔が前後に並んでいることを確認しよう。

□□□ No.10の骨にある□①は、脳神経である□②
17 と□③が入りする管である。
★★

- ① 内耳道
ないじどう
ないじしんけい
② 内耳神経
③ 顔面神経

図は頭蓋の内面(脳を取り除いて上からのぞいたところ)。
頸静脈孔もここから見える。



スライド61の図(頭蓋の内面)

□□□ 脳神経とは、□①ではなく脳から直接出入りして
18 いる□②である。
★

- ① 脊髄
せきずい
② 末梢神経
まつしようしんけい

スライドの注:「*脳神経: 脊髄ではなく脳から直接出入り
している末梢神経」。脳神経は、後期の神経で詳しく学ぶ。

□□□ No.17の②の神経は、□①と□②を伝える
19 □③神経である。
★★

- ① 聴覚
ちようかく
② 平衡覚
へいこうかく
③ 感覚

スライド61の本文では「内耳神経は聴覚と平衡覚を伝える
感覚神経」。

□□□ No.17の③の神経は、□①を支配する□②神
20 経である。
★

- ① 顔面の表情筋
② 運動

スライド61の本文では「顔面神経は顔面の表情筋を支配
する運動神経」。※一般的な教科書では、No.17の②・③
の神経のうち一方は混合神経とされるが、試験はスライド
どおり。

□□□ □①の中央部には、□②(脳の一部分)を囲
21 む凹みの□③がある。
★★

- ① 蝶形骨
ちようけいこつ
② 下垂体
かすいたい
③ トルコ鞍
トルコあん

まとめ:トルコ鞍=中央部にある凹みで、下垂体(脳の一部分)
を囲む。No.17の図の中央で、ピンク色の蝶形骨とトル
コ鞍の位置を確認しよう。

□□□ No.21の骨には、No.8の骨の咀嚼筋を支配する

22 ① が通る孔があり、これを ② という。

★★★

- ① さんさしんけい
三叉神経
② らんえんこう
卵円孔

まとめ: 卵円孔=三叉神経が通る。三叉神経は脳神経の1つで、スライドでは「下顎骨の咀嚼筋を支配する運動神経」とされている。※一般的な教科書では、この神経は混合神経とされ、②を通るのはその枝(下顎神経)だが、試験はスライドどおり。No.17の図で、卵円孔の位置を確認しよう。


□□□ No.21の骨には、眼に関係する脳神経の通り道もある。

23 ① には ② が通り、裂け目である

★★ ③ には ④ を支配する脳神経が通る。

- ① ししんけいかん
視神経管
② ししんけい
視神経
③ じょうがんかれつ
上眼窩裂
④ がんじゅうどう
眼球運動

スライドでは「視神経管:視神経を通す」「上眼窩裂:眼球運動を支配する脳神経が通る」。図で、眼の奥にある位置を確認しよう。



スライド67の図(頭蓋の前面、眼のまわりを拡大)

□□□ No.23の③を通る脳神経の例として、① ・

24 ② ・ ③ がある。

★★★

- ① どうがんしんけい
動眼神経
② がいてんしんけい
外転神経
③ かつしやしんけい
滑車神経

スライドでは「上眼窩裂:眼球運動を支配する脳神経(例えば動眼神経、外転神経、滑車神経)が通る」。

□□□ No.21の骨の前方にある骨を ① という。

25 ① には ② が空いており、③ を通している。

★★

重要


- ① しこつ
篩骨
② たすうの(こさな)あな
多数の(小さな)穴
③ きゅうしんけい
嗅神経

スライドでは「多数の穴が空いており、嗅神経を通して」(スライド71では「小さな穴:嗅神経」)。No.17の図で、篩骨が蝶形骨の前にあることを確認しよう。

- 鼻腔の中は、3つの ① と呼ばれる突起で分けら
 26 れている。このうち ② と ③ はNo.25の骨の
 ★★★ 一部で、④ だけは独立した骨(単独の骨)であ
 重要 る。

- ① **鼻甲介**
 じょうびこうかい
 ② **上鼻甲介**
 じょうびこうかい
 ③ **中鼻甲介**
 ちゅうびこうかい
 ④ **下鼻甲介**
 かびこうかい

スライド72では「**上鼻甲介と中鼻甲介は篩骨の構造物、下鼻甲介は独立した骨**」(太字・下線)。図は鼻腔と咽頭を縦に切り、横から見たところ。3段に並んだ**鼻甲介**を確認しよう。



スライド72の図(鼻腔の断面)

- No.26の①は、鼻腔を通る空気を ①、鼻腔内で
 27 ② を巻かせて壁にぶつける働きをもつ。その結
 ★★ 果、空気中の微粒子は壁の ③ に吸着し、
④ に達しない。

- ① **かき混ぜ**
 うず
 ② **渦**
 ③ **粘液**
 ④ **肺の奥**

流れ: **鼻腔を通る空気をかき混ぜ、鼻腔内で渦を巻かせて壁にぶつける→微粒子が壁の粘液に吸着し、肺の奥に達しない。上鼻甲介・中鼻甲介(篩骨の一部)と下鼻甲介(独立した骨)の3つが、この働きをしている。**

顔面頭蓋の骨の特徴

- No.8の骨以外の顔面頭蓋は、全て ① と接して
 28 いる。① は、② とともに ③ を形成す
 ★★ る。
 重要


- じょうがくこつ
 ① **上顎骨**
 こうがいこつ
 ② **口蓋骨**
 こうこうがい
 ③ **硬口蓋**

硬口蓋=上顎骨+口蓋骨。No.14の図(頭蓋を下から見たところ)の上側(歯のある前方)で、**硬口蓋**を作る2つの骨を確認しよう。

□□□ 左右の ① が癒合し損なうと、② を生じる。
 29 ② は、③ を伴って ④ となることもあ
 ★ る。

- ① こうこうがい
硬口蓋
こうがいれつ
② 口蓋裂
こうしんれつ
③ 口唇裂
こうしんこうがいれつ
④ 口唇口蓋裂

①は上顎骨または口蓋骨でできている。



スライド77の写真(口唇口蓋裂の症例)

□□□ No.29の②の子供は、①と②の間が交通
 30 しているため、②が食べ物で汚染される。
 ★

- ① こうくう
口腔
びくう
② 鼻腔

「交通している」とは、つながっているという意味。スライドの文は「口蓋裂の子供は、口腔と鼻腔の間が交通しているため鼻腔が食べ物で汚染され…」。

□□□ No.29の②の子供が起こしやすい病気には、①
 31 ・ ② ・ ③ がある。
 ★★

- ① ごえんせいはいえん
誤嚥性肺炎
へんとうえん
② 扁桃炎
ちゅうじえん
③ 中耳炎

理由はNo.30のとおり(口腔と鼻腔の間が交通している→鼻腔が食べ物で汚染される)。スライドでは「誤嚥性肺炎や扁桃炎、中耳炎を起こしやすくなる」(太字)。

□□□ 鼻中隔の後下半部を作る骨は ① である。また、
 32 ② は下部が軟骨とつながっている。
 ★★

重要

- ① 鋤骨(じょこつ)
② 鼻骨


No.5の図で、鋤骨と鼻骨の位置を確認しよう。

- 頭蓋から離れて(喉頭の約2cm上に)存在する骨を
 33 ① という。 ① は、全身の骨格の中で
 ★ ② である。
 重要

ぜっこつ
① 舌骨

② 唯一関節を持たない骨

図の上は、あごを上げた人の首で、黄色い部分が舌骨の位置。下は舌骨だけを示したもの。



スライド80の図

- No.33の骨は、 ① の ② と靱帯で結ばれて
 34 いる。また、喉頭を ③ させたり、 ④ の運動
 ★★ の支点となったりする。

そくとうこつ
① 側頭骨

けいじょうとつき
② 茎状突起

③ 上下

④ 舌

スライドでは「側頭骨の茎状突起と靱帯で結ばれている」。働きは喉頭を上下させる・舌の運動の支点となるの2つ。茎状突起は、No.10で答えた外耳道の直下の突起。

その他の頭蓋の特徴

- 頭蓋を構成する幾つかの骨に存在する空洞を
 35 ① という。空洞があることで、頭蓋の ② を
 ★ 軽減でき、声の ③ を増幅できる。

ふくびくう
① 副鼻腔

② 重量


③ 音量

スライドでは「空洞があることにより、頭蓋の重量を軽減できる」「声の音量を増幅できる」(重量を軽減・音量を増幅は太字)。

□□□ No.35の①には、①・②・③・
 36 ④の4つがある。
 ★

- ① 前頭洞
 ぜんとうどう
 ② 篩骨洞
 しとつどう
 ③ 蝶形骨洞
 ちようけいこつどう
 ④ 上顎洞
 じやうがくどう

4つの洞は、それぞれ名前と同じ骨の中にある(例: 前頭洞は前頭骨の中)。図は正面と横から見たところ。



スライド83の図

□□□ No.35の①は ① や ② と連絡しているた
 37 め、感染が波及して ③ (いわゆる ④) を起
 ★★ こすことがある。

- ① 鼻腔
 びくう
 ② 咽頭
 いんとう
 ③ 副鼻腔炎
 ふくびくうえん
 ④ 蓄膿症
 ちくのうしょう

スライドでは「これらの洞は、鼻腔や咽頭と連絡しているため感染が波及することがある(副鼻腔炎:いわゆる蓄膿症)」。

□□□ ① は、② への出口が下を向いていないた
 38 め、慢性のNo.37の③が多い。
 ★★★

- ① 上顎洞
 じやうがくどう
 ② 鼻腔
 びくう

スライドでは「特に上顎洞(鼻腔への出口が下を向いていない)と篩骨洞(次の問題)に慢性副鼻腔炎が多い」。スライド84でも「上顎洞:副鼻腔炎になりやすい」。

□□□ ① は、② のように入り組んでいるため、慢
 39 性のNo.37の③が多い。
 ★★


- ① 篩骨洞
 しとつどう
 ② 蜂の巣
 はちのす

スライドでは「篩骨洞(蜂の巣のように入り組んでいる)」。スライド84でも「篩骨洞:副鼻腔炎になりやすい」。

- 新生児の頭蓋で、骨同士がまだ完全に融合しておらず、骨と骨の間にある線維性の膜を ① という。
 ★ ① は ② に合わせて拍動している。① のおかげで、出産時に胎児の頭蓋を ③ で、④ を通りやすくなる。

- ① 泉門
 ② 脈拍
 ③ 小さく
 ④ 産道

スライドの文は「泉門のおかげで出産時に胎児の頭蓋を小さくでき、産道を通りやすくなる」。頭蓋骨は、もともと多数の骨が別々に発育し、成熟するにつれて融合したものの。図の左が新生児、右が成人の頭蓋を上から見たところ。



スライド85の図

- No.40の膜のうち、前頭骨と頭頂骨の間にあるものを ①、後頭骨と頭頂骨の間にあるものを ② という。① が閉鎖するのは ③ である。

- ① 大泉門
 ② 小泉門
 ③ 生後2年ころ

No.40の図の新生児では、前方(図の下側)にある大きいほうが大泉門、後方(図の上側)にある小さいほうが小泉門。

頭蓋の筋

- 頭蓋の筋は、① と ② の2つの筋群からなる。① は ③ または他の筋に停止し、顔の ④ を引っ張ることで ④ を作る。


- ① 顔面筋
 ② 咀嚼筋
 ③ 皮膚
 ④ 表情

まとめ: 顔面筋は皮膚または他の筋に停止し、顔の皮膚を引っ張ることで表情を作る。それぞれの筋群に含まれる筋は次の3問。

- No.42の①の筋群には6つの筋がある。そのうち、
 43 と後頭部にあるのは ① と ②、眼と口のま
 ★★ わりにあるのは ③ と ④ である。

- ① 前頭筋
 ② 後頭筋
 ③ 眼輪筋
 ④ 口輪筋

※この筋群の分け方は一般的な解剖学書と異なるが、試験はスライドどおり。図で位置を確認しよう。



スライド88の図(頭部の筋)

- No.42の①の筋群の残りの2つは、 ① と
 44 ② である。このうち ② は、No.42の②の筋
 ★★★ 群にも含まれる。

- ① 頬骨筋
 ② 頬筋

スライドでは「**頬筋**(咀嚼筋にも含まれる)」**・**「**頬骨筋**」。名前が似ているので注意(それぞれの働きは後の問題)。No.43の図で位置を確認しよう。

- No.42の②の筋群は ① に関する筋群で、
 45 ② ・ ③ ・ ④ の3つがある。
 ★★

- ① 咀嚼
 ② 頬筋
 ③ 咬筋
 ④ 側頭筋

スライドでは「咀嚼筋は、咀嚼に関係する」。頬筋は顔面筋にも含まれる。

- ① から起こり、眉部の皮膚に停止する筋を
 46 ② といい、収縮すると ③。① の後端
 ★★ にあり、頭皮を後方に引く筋は ④ である。

- ① 帽状腱膜
 ② 前頭筋
 ③ 額に皺ができる
 ④ 後頭筋

帽状腱膜は頭の上をおおう膜で、その前に**前頭筋**、後ろに**後頭筋**がある(No.43の図)。

- 目を閉じたり(閉眼)、細めたり、瞬きをしたりする筋
 47 は ① である。口を閉じる筋は ② で、
 ★ ③ 働きもあることから、英語で ④ と呼ばれる。

- ① 眼輪筋
 ② 口輪筋
 ③ 唇を突き出す
 ④ kissing muscle

No.43の図で、目のまわりの**眼輪筋**と、口のまわりの**口輪筋**を確認しよう。

- ^{こうかく} 口角から頬骨に広がる筋を ① といい、 ②
 48 働きがあることから、英語で ③ とも呼ばれる。
 ★★

- ① ^{きょうこつきん} 頬骨筋
 ② 口角を横に引き上げる
 ③ smiling muscle

口輪筋 (kissing muscle) とセットで覚えよう。

- 頬を横切り、No.47の②の筋に停止する筋を ①
 49 という。 ① は、顔面筋としては ② 働き、咀
 ★★ 嚼筋としては咀嚼時に食べ物を ③ 働きがある。


- ① ^{きょうこつきん} 頬筋
 ② 頬の肉を平らにする
 ③ 口にくわえる

頬筋は、顔面筋と咀嚼筋の両方に含まれる (No.43)。咀嚼筋としての働きは、スライドでは「咀嚼時に食べ物を口にくわえる」。

- 咀嚼筋のうち、 ① ^{かがくかく} から起こり下顎角に停止する
 50 ② は、下顎骨を ③ 。
 ★★

- ① ^{きょうこつきやう} 頬骨弓
 ② ^{こうきん} 咬筋
 ③ 持ち上げる

スライドでは「咬筋: 頬骨弓から起こり、下顎角に停止。下顎骨を持ち上げる」(太字・下線)。



スライド90 (動画) の画面: 色がついた筋のうち、上の扇形の筋が側頭筋、下の筋が咬筋

- 咀嚼筋のうち、側頭骨の表面をおおい、下顎骨に停
 51 止する ① は、No.50の②の ② である。
 ★★

- ① ^{そくとうきん} 側頭筋
 ② 協力筋

スライドでは「側頭筋: 側頭骨の表面をおおい、下顎骨に停止する。咬筋の協力筋」(下線)。No.50の図で、上の扇形の筋を確認しよう。

頸部の筋

- 胸筋を覆う結合組織から起こり、口の周辺に停止する頸部の筋を ① という。① は、② を★ 下げて ③ 表情を作る。

- 頸部の筋のうち、二頭筋であるものを ① という。53 ① は、② と ③ から起こり、④ に★★ 停止する。

重要

- No.53の筋は、両側が働くと首が ① するので、54 ② とも呼ばれる。片方のみが働くと、③ 方★★ に頭が傾く。


- 先天的に片方のNo.53の筋が短縮すると、① 55 を起こす。★

- こうけいきん
① 広頸筋
こうかく
② 口角
③ 悲しい

スライドでは「口角を下げて悲しい表情を作る」。No.43の図では、首の前面の下の方に広頸筋のラベルがある。

- きょうさきにゆうとつじん
① 胸鎖乳突筋
きょうこつへい
② 胸骨(胸骨柄)
③ 鎖骨(近位部)
④ 側頭骨の乳様突起

名前の「胸・鎖・乳突」は、起こる所(胸骨・鎖骨)と停止する所(乳様突起)を表している。




スライド91の図

- ぜんくつ
① 前屈
② 祈りの筋
③ 収縮した

スライドでは「両側が働くと、首が前屈する(祈りの筋)」。「片方のみが働くと収縮した方に頭が傾く」。※一般的な教科書では、片方のみが働くときに「顔を反対側に向ける(回旋)」もあるが、試験はスライドどおり。No.53の図の矢印で、動く方向を確認しよう。

- しゃけい
① 斜頸

図と写真で、首が片方に傾いているようすを確認しよう。



スライド93の図(左のイラストの英語「Shortened neck muscle」は「短縮した首の筋」の意味で、胸鎖乳突筋のこと。右は症例の写真)