

# 定常的とみなせる外力が加わった際の荷電粒子の運動

20B01392 松本侑真

2022 年 12 月 20 日

## 概要

プラズマ物理学において、定常的な外力が加わった差異の荷電粒子の運動についてまとめる。また、外力が時間的に変化している場合においても、粒子のサイクロトロン運動よりも十分にゆっくりであれば成立する。

## 目次

1	一様定常磁場と定常的な外力	2
1.1	定常的な電場が印加されているとき . . . . .	2
2	空間的に変化する定常磁場	3
2.1	磁場と垂直な方向に勾配が生じている場合 . . . . .	3
2.2	湾曲磁場について . . . . .	4
2.3	磁場と平行な方向に勾配が生じている場合 . . . . .	5
3	一様定常磁場と時間的に緩やかに変化する一様電場	6
4	一様定常磁場と時間的に定常で緩やかに空間変化する電場	6

## 1 一様定常磁場と定常的な外力

荷電粒子に対して一様定常磁場  $\mathbf{B}$  と定常的な外力  $\mathbf{F}(\mathbf{x})$  が印加している場合を考える。まずは、粒子の速度ベクトルを磁場  $\mathbf{B}$  に垂直な方向と平行な方向へと分解する：

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_\perp + \mathbf{v}_\parallel。 \quad (1.1)$$

外力の磁場に平行な成分については、大きさが  $\mathbf{F}_\parallel/m$  の等加速度直線運動を与えるだけである。そのため、以下では磁場  $\mathbf{B}$  と垂直な成分のみを考える ( $\mathbf{F} = \mathbf{F}_\perp$ )。このとき、磁場に垂直な方向における荷電粒子の運動方程式は

$$m\dot{\mathbf{v}}_\perp = q(\mathbf{v}_\perp \times \mathbf{B}) + \mathbf{F}_\perp \quad (1.2)$$

となる。外力が加わっていない場合、磁場  $\mathbf{B}$  に垂直な方向において荷電粒子は円運動を行うことが直ちにわかる。そのため、 $\mathbf{v}_\perp$  を  $\mathbf{v}_0$  (円運動成分) と  $\mathbf{v}_F$  (ドリフト運動成分) に分解して考える。<sup>\*1</sup>このとき、円運動成分については以下の運動方程式が成立している：

$$m\dot{\mathbf{v}}_0 = q(\mathbf{v}_0 \times \mathbf{B})。 \quad (1.3)$$

定常的な外力が印加されていることから、 $\mathbf{v}_F$  の時間変化がないと考えて良い<sup>\*2</sup>ため、式 (1.2) は

$$m\dot{\mathbf{v}}_0 = q(\mathbf{v}_0 \times \mathbf{B}) + q(\mathbf{v}_F \times \mathbf{B}) + \mathbf{F}_\perp \quad (1.4)$$

と書き直すことができる。したがって、

$$q(\mathbf{v}_F \times \mathbf{B}) + \mathbf{F}_\perp = \mathbf{0} \quad (1.5)$$

が成立している。右から  $\mathbf{B}$  の外積を取ってみると、 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{a}$  を用いて、

$$q(\mathbf{v}_F \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} = -qB^2\mathbf{v}_F = -\mathbf{F}_\perp \times \mathbf{B} \quad (1.6)$$

となる。したがって、ドリフト運動  $\mathbf{v}_F$  は

$$\mathbf{v}_F = \frac{\mathbf{F}_\perp \times \mathbf{B}}{qB^2} = \frac{\mathbf{F} \times \mathbf{B}}{qB^2} \quad (1.7)$$

と求まる。つまり、定常的な外力が加わっている方向には運動しない。

### 1.1 定常的な電場が印加されているとき

例として定常的な電場  $\mathbf{E}$  が印加されている場合には、ドリフト運動は電荷に依らないことがわかる。式 (1.7) によると、

$$\mathbf{v}_E = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2} \quad (1.8)$$

となるため、プラズマ中の電子とイオンは同じ速度で同じ方向にドリフトする。そのため、プラズマ中に電離が生じることがなく、電流は流れない。また、プラズマ全体は磁力線を横切ってドリフトしていくことがわかる。

---

<sup>\*1</sup> ローレンツ力と外力が張る平面が磁場と垂直であるため、 $\mathbf{v}_\parallel$  方向に  $\mathbf{v}_F$  は存在しない。

<sup>\*2</sup> 円運動について平均を取ると直流成分のみが残り、それが  $\mathbf{v}_F$  となるはずだから、時間変化はないと考えて良い。

## 2 空間的に変化する定常磁場

### 2.1 磁場と垂直な方向に勾配が生じている場合

次に、磁場が空間的に変化する場合を考えよう。磁場  $\mathbf{B}$  は  $z$  成分のみを持つとするとして、その強さが  $y$  依存性を持つとする：

$$\mathbf{B} = (0 \quad 0 \quad B(y))^T. \quad (2.1)$$




図 1: 磁場と垂直な方向に勾配が生じている場合

また、 $B(y)$  は緩やかに変化しているとする。<sup>\*3</sup> すなわち、回転中心における Taylor 展開の 1 次項までで近似できるとする：

$$B(y) = B_0 + \left( \frac{\partial B}{\partial y} \right)_0 y = B_0 + \left( \frac{\partial B}{\partial y} \right)_0 r_L \sin \theta. \quad (2.3)$$

ここで、 $r_L$  は Larmor 半径であり、大きさ  $B$  の定常磁場のみが印加されている際の粒子の磁場に直交する速度成分の大きさを  $v_\perp$  として、 $r_L = mv_\perp / qB$  と表される。また、回転中心における磁場の大きさを  $B_0$  とした。さらに、粒子が 1 回転する間では磁場の変化が微小であると仮定しているため、 $y = r_L \sin \theta$  が成立している。粒子にかかる力について、1 回転に関する平均値を取ると Larmor 円運動に関する成分は 0 になるため、磁場の変化によって生じる成分が残る。これを定常的な外力  $\mathbf{F}$  とみなすこととする。1 回転中のイオンにかかる Lorentz 力を

<sup>\*3</sup> 緩やかさを表す指標としては、特性長  $L$  という概念を考えれば良い。これは、ある物理量の変化が物理量自体に影響を及ぼすのに必要な距離の目安であり、今の状況であれば

$$L := B_0 / (\partial_y B_0) \quad (2.2)$$

である。円運動の半径が急激に変化しない場合を考えたいため、 $L \gg r_L$  が成立しているとき、 $B(y)$  は緩やかに変かしていると言える。

考える。\$v\_x = v\_{\perp} \cos \theta\$, \$v\_y = -v\_{\perp} \sin \theta\$ であることに注意すると、\$F\_x, F\_y\$ は以下のように計算できる：

$$F_x = qv_y B_z = -qv_{\perp} \cos \theta B(y) = -qv_{\perp} \cos \theta \left( B_0 + \left( \frac{\partial B}{\partial y} \right)_0 r_L \sin \theta \right), \quad (2.4)$$

$$F_y = -qv_x B_z = -qv_{\perp} \sin \theta B(y) = -qv_{\perp} \sin \theta \left( B_0 + \left( \frac{\partial B}{\partial y} \right)_0 r_L \sin \theta \right). \quad (2.5)$$

したがって、\$\bar{F}\_x = 0\$, \$\bar{F}\_y \neq 0\$ となることがわかる。実際に計算すると、

$$\bar{F}_y = -qv_{\perp} r_L \left( \frac{\partial B}{\partial y} \right)_0 \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta = -\frac{1}{2} qv_{\perp} r_L \left( \frac{\partial B}{\partial y} \right)_0 = -\frac{mv_{\perp}^2/2}{B_0} \left( \frac{\partial B}{\partial y} \right)_0 \quad (2.6)$$

となるため、磁気モーメント \$\mu\_m := mv\_{\perp}^2/(2B)\$ を用いて、一定の外力 \$F\_y = -\mu\_m (\partial B/\partial y)\$ がイオンの運動中に印加されていると考えて良いことがわかる。磁場に垂直な一般の方向に対する変化に拡張するのは容易であり、

$$\mathbf{F} = -\mu_m (\nabla B)_{\perp} \quad (2.7)$$

と表される。なお、磁気モーメントとは、電流が旋回しているときの面積と電流の積であるため、

$$\mu_m = SI = \pi r_L^2 \times q \left( \frac{\omega_c}{2\pi} \right) = (r_L \omega_c)^2 \frac{m}{q} \frac{q}{2} = \frac{mv_{\perp}^2/2}{B} \quad (2.8)$$

のようにして求められる値である。話を戻して、磁場の垂直方向の勾配によって生じる外力のドリフト速度は

$$\mathbf{v}_B = \frac{-\mu_m (\nabla B)_{\perp} \times \mathbf{B}}{qB^2} = \frac{\mu_m \mathbf{B} \times \nabla B}{qB^2} \quad (2.9)$$

となる。これを gradB ドリフトと呼ぶ。

## 2.2 湾曲磁場について

次に、磁場が湾曲している場合について考える。荷電粒子は磁力線の周りをらせん運動するため、磁場が湾曲している場合は遠心力が生じることがわかる。磁場の曲率半径を \$R\_c\$ として、曲率中心から荷電粒子の位置へ伸びるベクトルを \$\mathbf{R}\_c\$ とする。このとき、荷電粒子にかかる遠心力 \$\mathbf{F}\_{cf}\$ は

$$\mathbf{F}_{cf} = \frac{mv_{\parallel}^2}{R_c} \frac{\mathbf{R}_c}{R_c} \quad (2.10)$$

となる。ただし、\$\mathbf{v}\_{\parallel}\$ は磁力線と平行な方向の荷電粒子の速度ベクトルである。したがって、湾曲磁場によって速度

$$\mathbf{v}_R = \frac{\mathbf{F}_{cf} \times \mathbf{B}}{qB^2} = \frac{mv_{\parallel}^2}{q} \frac{\mathbf{R}_c \times \mathbf{B}}{R_c^2 B^2} \quad (2.11)$$

のドリフト運動が生じることがわかる。このドリフトは湾曲ドリフトや遠心力ドリフトと呼ばれる。さらに、湾曲ドリフトが生じていれば必ず gradB ドリフトが存在することがわかる。磁場が湾曲している場合、局所的には円形に湾曲していると考えられる。ここで、外部電場と外部電流が存在しないことから、\$\nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{0}\$ が成立していることに着目する。円筒座標系で書き下すと \$\mathbf{B}\$ が \$\theta\$ 成分しか持たないことと、\$\mathbf{B}\$ は \$r\$ 方向にしか変化しないことに注意すると、

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r B_{\theta}) \mathbf{e}_z = 0 \quad \therefore B_{\theta} \propto \frac{1}{r} \quad (2.12)$$

が成立する。すなわち、曲率半径 \$R\_c\$ の近傍では

$$(\nabla B)_{\perp} = \nabla B \propto -\frac{\mathbf{e}_r}{R_c^2}, \quad \frac{\nabla B}{B} = -\frac{\mathbf{R}_c}{R_c^2} \quad (2.13)$$

となる。したがって、gradB ドリフトは

$$\mathbf{v}_B = -\frac{mv_\perp^2}{2B} \frac{\nabla B \times \mathbf{B}}{qB^2} = \frac{mv_\perp^2/2}{q} \frac{\mathbf{R}_c \times \mathbf{B}}{R_c^2 B^2} \quad (2.14)$$

が生じる。以上より、湾曲磁場が存在している場合に生じるドリフト速度  $\mathbf{v}_D$  は

$$\mathbf{v}_D = \mathbf{v}_R + \mathbf{v}_B = \frac{m}{q} \frac{\mathbf{R}_c \times \mathbf{B}}{R_c^2 B^2} \left( v_\parallel^2 + \frac{1}{2} v_\perp^2 \right) \quad (2.15)$$

となる。このようなドリフトが加わるのは望ましいことではない。なぜなら、熱核融合プラズマを閉じ込める目的で磁場をトーラス状に曲げた際に、粒子はトーラスの外部にドリフトしてしまうからである。

## 2.3 磁場と平行な方向に勾配が生じている場合

磁場と平行な方向に勾配が生じている場合について考える。磁場に垂直な方向に勾配が生じている場合は、磁場の方向と垂直な方向へドリフトすることがわかったが、平行な勾配に関してはどうであろうか。結論から述べると、ドリフト運動は生じない。これは、 $\nabla B \parallel \mathbf{B}$  が成立しているため、 $\mathbf{F} \times \mathbf{B} = \mathbf{0}$  となることからわかる。しかし、実際に  $\mathbf{F}$  の表式を計算してみると面白い結果が得られることを示す。




図 2: 磁場と平行な方向に勾配が生じている場合

図 2 のように、磁場のだいたいの向きが  $z$  方向であり、磁場の強さの変化が  $z$  方向であるとする。このとき、必然的に磁場の収束・発散により  $r$  方向にも磁場は存在する。軸対称性を課することによって  $\theta$  方向の磁場は存在しない。ここでは、Maxwell 方程式  $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$  に着目する。円筒座標系で書き下してみると、

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(rB_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial B_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0 \implies \frac{\partial B_r}{\partial r} + \frac{B_r}{r} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0 \quad (2.16)$$

となる。 $B_r(0) = 0$  とすると、 $(\partial B_r / \partial r)_{r \rightarrow 0} = (B_r / r)_{r \rightarrow 0}$  が成立するため、式 (2.16) を  $B_r$  について解くと、 $r_L$  が十分に小さいときは

$$B_r(r_L) = -\frac{r_L}{2} \left( \frac{\partial B_z}{\partial z} \right)_{r \rightarrow 0} \quad (2.17)$$

となる。ここで、旋回中の平均 Lorentz 力を考えると、 $r$  方向は 0 となるが、 $\mathbf{B}$  と平行な方向の力  $F_\parallel$  は

$$F_\parallel = qv_\perp B_r(r_L) \quad (2.18)$$

となる。したがって、外力  $\mathbf{F} = F_{\parallel} \mathbf{e}_z$  が荷電粒子にかかる。  $r_L = mv_{\perp}/(qB_z)$  であることより、

$$F_{\parallel} = -\frac{mv_{\perp}^2/2}{B_z} \left( \frac{\partial B_z}{\partial z} \right)_{r \rightarrow 0} \mathbf{e}_z = -\mu_{\parallel} (\nabla B)_{\parallel} \quad (2.19)$$

と計算できる。すなわち、ドリフト運動は生じないが、磁場が弱くなる方向へ荷電粒子が押し出されることがわかる。

3 一様定常磁場と時間的に緩やかに変化する一様電場

4 一様定常磁場と時間的に定常で緩やかに空間変化する電場